

## О ФУНКТОРНОМ МЕТОДЕ ИЗУЧЕНИЯ РЕШЕТОК ПОДГРУПП КОНЕЧНЫХ ГРУПП

А. Ф. Васильев, С. Ф. Каморников

**Аннотация:** Предлагается функторный подход к развитию результата Виландта о решетке субнормальных подгрупп конечных групп. На основе аксиоматизации свойств субнормальных подгрупп в работе вводится понятие естественного транзитивного решеточного функтора и описываются все решетки, индуцируемые такими функторами в конечных разрешимых группах. Библиогр. 10.

### Введение

Хорошо известно, что множество всех нормальных подгрупп образует решетку в любой группе. В 1939 г. Виландт [1] установил, что таким свойством обладает также множество всех субнормальных подгрупп в любой конечной группе. Развивая этот результат, Кегель в 1978 г. в работе [2] ввел понятие  $\mathfrak{F}$ -достижимой подгруппы и доказал, что множество всех  $\mathfrak{F}$ -достижимых подгрупп образует решетку в любой конечной группе, если  $\mathfrak{F}$  — наследственная замкнутая относительно расширений формация. Здесь же Кегель поставил задачу нахождения других классов  $\mathfrak{F}$  с этим свойством.

Наряду с понятием  $\mathfrak{F}$ -достижимой подгруппы другим естественным обобщением субнормальности является понятие  $\mathfrak{F}$ -субнормальности (см. [3, 4]). В 1978 г. Л. А. Шеметков в [3] под номером 12 поставил следующую проблему. В каких случаях множество всех  $\mathfrak{F}$ -субнормальных подгрупп группы  $G$  образует решетку? Эта задача в несколько другой редакции вошла в «Коуровскую тетрадь» [5, проблема 9.75]. В работе [6] установлена эквивалентность задач Кегеля и Шеметкова, а также получено описание всех локальных наследственных формаций, для которых множество всех  $\mathfrak{F}$ -субнормальных ( $\mathfrak{F}$ -достижимых) подгрупп образует решетку в каждой конечной группе. Аналогичная задача в классе конечных разрешимых групп рассмотрена в [7].

Несмотря на законченный характер результатов работы [6], остается открытым вопрос о существовании в конечных группах других естественных решеток, аналогичных решетке всех субнормальных подгрупп. В настоящей работе мы предлагаем другой более общий (функторный) подход развития результата Виландта. Аксиоматизируя основные свойства субнормальных подгрупп (инвариантность при гомоморфизмах, транзитивность, наследственность в подгруппах), мы вводим понятие естественного транзитивного решеточного функтора и описываем все решетки, индуцируемые такими функторами в конечных разрешимых группах.

### 1. Постановка задачи.

#### Формулировка основного результата

Пусть  $A, B$  — группы,  $\phi : A \rightarrow B$  — эпиморфизм, и пусть  $\Omega$  и  $\Sigma$  — некоторые

системы подгрупп из  $A$  и  $B$  соответственно. В дальнейшем через  $\Omega^\phi$  обозначается множество  $\{H^\phi \mid H \in \Omega\}$ , а через  $\Sigma^{\phi^{-1}}$  — множество  $\{H^{\phi^{-1}} \mid H \in \Sigma\}$  всех полных прообразов в  $A$  всех подгрупп из  $\Sigma$ .

Пусть  $\Theta$  — отображение, которое ставит в соответствие каждой группе  $G$  некоторую непустую систему  $\Theta(G)$  ее подгрупп. Говорят [8], что  $\Theta$  — *подгрупповой функтор*, если выполняется условие абстрактности:

$$(\Theta(G))^\phi = \Theta(G^\phi)$$

для любого изоморфизма  $\phi$  каждой группы  $G$ .

Если  $H$  — подгруппа группы  $G$ , то через  $H \cap \Theta(G)$  обозначается множество  $\{H \cap R \mid R \in \Theta(G)\}$ .

Подгрупповой функтор  $\Theta$  будем называть

1) *естественным*, если  $(\Theta(A))^\phi \subseteq \Theta(B^\phi)$  и  $(\Theta(B))^{\phi^{-1}} \subseteq \Theta(A)$  для любого эпиморфизма  $\phi : A \rightarrow B$ , а также  $H \cap \Theta(G) \subseteq \Theta(H)$  для любой подгруппы  $H$  группы  $G$ ;

2) *транзитивным*, если  $\Theta(H) \subseteq \Theta(G)$  для любой подгруппы  $H \in \Theta(G)$ ;

3) *решеточным*, если всегда из  $H, K \in \Theta(G)$  следует, что  $H \cap K \subseteq \Theta(G)$  и  $\langle H, K \rangle \subseteq \Theta(G)$ .

Примерами естественных транзитивных решеточных функторов (называемых далее ЕТР-функторами) являются функторы, выделяющие в каждой конечной группе  $G$  множество  $S(G)$  всех ее подгрупп; множество  $\{G\}$ ; множество  $\text{sn}(G)$  всех ее субнормальных подгрупп. Другие примеры ЕТР-функторов получены в [6].

Возникает задача нахождения всех ЕТР-функторов, заданных на группах из данного класса групп  $\mathfrak{X}$ .

Следующая теорема решает эту задачу в случае, когда  $\mathfrak{X}$  — класс всех разрешимых конечных групп.

**Теорема.** Пусть  $\Theta$  — подгрупповой ЕТР-функтор. Тогда

- 1) класс  $\mathfrak{X}_\Theta = \{G \mid \Theta(G) = S(G)\}$  — наследственная локальная формация;
- 2) существует такое разбиение  $\{\pi_i \mid i \in I\}$  множества  $\pi(\mathfrak{X}_\Theta)$ , что  $\mathfrak{X}_\Theta = D_0(\bigcup_{i \in I} \mathfrak{S}_{\pi_i})$ ;
- 3)  $\Theta(G) = \text{sn}_{\mathfrak{X}_\Theta}(G)$  для любой группы  $G$ .

## 2. Предварительные сведения

В работе рассматриваются только конечные разрешимые группы. Определения и обозначения, связанные с теорией классов, можно найти в [3, 4]. Напомним некоторые из них.

Для непустой формации  $\mathfrak{F}$  подгруппа  $H$  группы  $G$  называется  $\mathfrak{F}$ -субнормальной, если либо  $H = G$ , либо существует максимальная цепь подгрупп  $G = K_0 \supset K_1 \supset \dots \supset K_n = H$  такая, что  $K_{j-1}^{\mathfrak{F}} \subseteq K_j$  для всех  $j = 1, 2, \dots, n$ . Функтор, сопоставляющий каждой группе множество всех ее  $\mathfrak{F}$ -субнормальных подгрупп, будем обозначать через  $\text{sn}_{\mathfrak{F}}$ .

**Лемма 2.1.** Пусть  $\mathfrak{F}$  — непустая наследственная формация. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) если  $H \in \text{sn}_{\mathfrak{F}}(G)$  и  $K$  — подгруппа из  $G$ , то  $H \cap K \in \text{sn}_{\mathfrak{F}}(K)$ ;
- 2) если  $H \in \text{sn}_{\mathfrak{F}}(G)$  и  $K \in \text{sn}_{\mathfrak{F}}(G)$ , то  $H \cap K \in \text{sn}_{\mathfrak{F}}(G)$ .

**Лемма 2.2.** Пусть  $\mathfrak{F}$  — непустая формация. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) если  $H \in \text{sn}_{\mathfrak{F}}(G)$  и  $N \triangleleft G$ , то  $HN \in \text{sn}_{\mathfrak{F}}(G)$ ;
- 2) если  $H \in \text{sn}_{\mathfrak{F}}(G)$  и  $N \triangleleft G$ , то  $HN/N \in \text{sn}_{\mathfrak{F}}(G/N)$ ;
- 3) если  $H \subseteq K$ ,  $H \in \text{sn}_{\mathfrak{F}}(K)$  и  $K \in \text{sn}_{\mathfrak{F}}(G)$ , то  $H \in \text{sn}_{\mathfrak{F}}(G)$ .

Доказательство лемм 2.1, 2.2 осуществляется непосредственной проверкой.

Из лемм 2.1 и 2.2 следует, что функтор  $\text{sn}_{\mathfrak{F}}$  является естественным транзитивным подгрупповым функтором в случае, когда  $\mathfrak{F}$  — наследственная формация.

Будем говорить, что формация  $\mathfrak{F}$  обладает решеточным свойством, если функтор  $\text{sn}_{\mathfrak{F}}$  решеточный.

Нам понадобится следующая теорема, устанавливающая строение наследственных локальных формаций, обладающих решеточным свойством.

**Теорема 2.1** [6]. Пусть  $\mathfrak{F}$  — наследственная локальная формация. Тогда и только тогда  $\mathfrak{F}$  обладает решеточным свойством, когда  $\mathfrak{F} = D_0(\bigcup_{i \in I} \mathfrak{S}_{\pi_i})$ , где

$$\bigcup_{i \in I} \pi_i = \pi(\mathfrak{F}) \text{ и } \pi_i \cap \pi_k = \emptyset \text{ для любых } k \neq l \text{ из } I.$$

Если  $\mathfrak{X}$  — класс групп, то через  $D_0\mathfrak{X}$  обозначается класс всех групп, представимых в виде  $H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_t$ , где  $H_i \in \mathfrak{X}$  для  $i = 1, 2, \dots, t$ .

Легко устанавливается справедливость следующей леммы.

**Лемма 2.3.** Пусть  $\{\mathfrak{X}_i \mid i \in I\}$  — некоторое семейство классов групп. Если  $\mathfrak{X}_i$  — наследственная локальная формация для любого  $i \in I$  и  $\pi(\mathfrak{X}_i) \cap \pi(\mathfrak{X}_j) = \emptyset$  для  $i \neq j \in I$ , то класс  $D_0(\bigcup_{i \in I} \mathfrak{X}_i)$  также является наследственной локальной формацией.

Если  $\mathfrak{F}$  — класс групп, то через  $M(\mathfrak{F})$  обозначается класс всех минимальных не  $\mathfrak{F}$ -групп, т. е. групп, у которых данному классу  $\mathfrak{F}$  принадлежат все собственные подгруппы, и только они. Важную роль в задачах классификации формаций играют формации с условием Шеметкова (кратко,  $\check{S}$ -формации), т. е. формации, у которых любая минимальная не  $\mathfrak{F}$ -группа является либо группой Шмидта, либо группой простого порядка. Нам понадобятся следующие два результата о  $\check{S}$ -формациях.

**Теорема 2.2** [9]. Пусть  $\mathfrak{F}$  — наследственная  $\check{S}$ -формация. Тогда  $\mathfrak{F}$  является локальной формацией.

**Теорема 2.3** [10]. Пусть  $\mathfrak{F}$  — наследственная формация. Тогда и только тогда  $\mathfrak{F}$  является  $\check{S}$ -формацией, когда  $\mathfrak{F}$  имеет такой локальный экран  $f$ , что  $f(p) = \mathfrak{S}_{\pi(f(p))}$  для  $p \in \pi(\mathfrak{F})$ ;  $f(p) = \emptyset$  для  $p \notin \pi(\mathfrak{F})$  и, кроме того,  $f(p) = \mathfrak{N}_p f(p)$  для любого простого  $p$ .

### 3. Доказательство теоремы

Всюду в дальнейшем термин «подгрупповой функтор» означает «естественный подгрупповой функтор».

Доказательству теоремы предположим ряд лемм.

**Лемма 3.1.** Пусть  $\Theta$  — подгрупповой функтор. Если  $1 \in \Theta(G)$ , то все нормальные подгруппы из  $G$  входят в  $\Theta(G)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $1 \in \Theta(G)$  и  $N \triangleleft G$ . Рассмотрим естественный гомоморфизм  $\phi$  группы  $G$  с ядром  $N$ . Тогда из определения подгруппового функтора следует, что  $1^\phi = N/N \in \Theta(G/N)$ , а значит,  $N = (N/N)^{\phi^{-1}} \in \Theta(G)$ . Лемма доказана.

**Лемма 3.2.** Пусть  $\Theta$  — транзитивный подгрупповой функтор. Если  $1 \in \Theta(G)$ , то все субнормальные подгруппы из  $G$  входят в  $\Theta(G)$ . В частности, если группа  $G$  нильпотентна и  $1 \in \Theta(G)$ , то  $\Theta(G) = S(G)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $G$  — группа наименьшего порядка, для которой лемма не выполняется. Пусть  $H$  — субнормальная подгруппа группы  $G$ , не входящая в  $\Theta(G)$ . Заключим  $H$  в максимальную нормальную подгруппу  $R$  группы  $G$ . Ввиду леммы 3.1  $R \in \Theta(G)$ . Из свойств подгруппового функтора и  $1 \in \Theta(G)$  следует, что  $1 \in \Theta(R)$ . В силу выбора группы  $G$  заключаем, что  $H \in \Theta(R)$ . Так как функтор  $\Theta$  транзитивен, то  $H \in \Theta(G)$ . Пришли к противоречию. Лемма доказана.

**Лемма 3.3.** Пусть  $\Theta$  — транзитивный подгрупповой функтор, и пусть  $Z_p$  — циклическая группа порядка  $p$ , для которой  $1 \in \Theta(Z_p)$ . Тогда  $\Theta(P) = S(P)$  для любой  $p$ -группы  $P$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем, что всегда  $1 \in \Theta(P)$ . Предположим, что это не так. Пусть  $P$  — группа наименьшего порядка, для которой  $1 \notin \Theta(P)$ , и  $M$  — максимальная нормальная подгруппа группы  $P$ . Так как  $|M| < |P|$ , то  $1 \in \Theta(M)$ . Поскольку  $|P/M| = p$ , из  $1 = M/M \in \Theta(P/M)$  следует, что  $M \in \Theta(P)$ . Из транзитивности функтора  $\Theta$  имеем  $1 \in \Theta(P)$ . Ввиду леммы 3.2 заключаем, что  $\Theta(P) = S(P)$ . Лемма доказана.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Характеристикой подгруппового функтора  $\Theta$  называется множество всех тех простых чисел  $p$ , для которых  $1 \in \Theta(Z_p)$ .

Если  $\Theta$  — подгрупповой функтор, то далее через  $\mathfrak{X}_\Theta$  будет обозначать класс  $\{G \mid \Theta(G) = S(G)\}$ , т. е. класс групп  $G$ , все подгруппы которых входят в  $\Theta(G)$ .

**Лемма 3.4.** Если  $\Theta$  — подгрупповой ЕТР-функтор, то класс групп  $\mathfrak{X}_\Theta$  является наследственной формацией.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$  и  $N$  — нормальная подгруппа группы  $G$ . Если  $H/N$  — подгруппа группы  $G/N$ , то из  $H \in \Theta(G)$  и определения подгруппового функтора следует, что  $H/N \in \Theta(G/N)$ . Так как подгруппа  $H/N$  выбрана произвольно, то  $\Theta(G/N) = S(G/N)$ , т. е.  $G/N \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Следовательно,  $\mathfrak{X}_\Theta$  — гомоморф.

Пусть теперь  $N_1$  и  $N_2$  — нормальные подгруппы группы  $G$  и  $G/N_1 \in \mathfrak{X}_\Theta$ ,  $G/N_2 \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Если  $P$  — силовская подгруппа группы  $G$ , то из условия леммы следует, что  $PN_i/N_i \in \Theta(G/N_i)$ ,  $i = 1, 2$ . Тогда из определения подгруппового функтора получаем, что  $PN_i \in \Theta(G)$  и  $PN_i/N_1 \cap N_2 \in \Theta(G/N_1 \cap N_2)$ ,  $i = 1, 2$ . Так как функтор  $\Theta$  является решеточным, то  $PN_1/N_1 \cap N_2 \cap PN_2/N_1 \cap N_2 = P(N_1 \cap N_2)/N_1 \cap N_2 \in \Theta(G/N_1 \cap N_2)$ . Так как  $N_1 \cap N_2 \in \Theta(G)$ , то единичная подгруппа группы  $G/N_1 \cap N_2$  входит в  $\Theta(G/N_1 \cap N_2)$ . Из свойств подгруппового функтора  $\Theta$  следует, что единичная подгруппа группы  $G/N_1 \cap N_2$  входит в  $\Theta(P(N_1 \cap N_2)/N_1 \cap N_2)$ . Значит, ввиду леммы 3.2

$$\Theta(P(N_1 \cap N_2)/N_1 \cap N_2) = S(P(N_1 \cap N_2)/N_1 \cap N_2).$$

Поскольку функтор  $\Theta$  является транзитивным, все подгруппы группы  $P(N_1 \cap N_2)/N_1 \cap N_2$  входят в  $\Theta(G/N_1 \cap N_2)$ .

Итак, все примарные подгруппы группы  $G/N_1 \cap N_2$  входят в  $\Theta(G/N_1 \cap N_2)$ . Так как любая подгруппа порождается своими примарными подгруппами, а функтор  $\Theta$  является решеточным, то  $\Theta(G/N_1 \cap N_2) = S(G/N_1 \cap N_2)$ . Таким образом,  $G/N_1 \cap N_2 \in \mathfrak{X}_\Theta$ , и класс  $\mathfrak{X}_\Theta$  является формацией.

Установим наследственность формации  $\mathfrak{X}_\Theta$ . Пусть  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$  и  $H$  — подгруппа из  $G$ . Если  $K$  — произвольная подгруппа из  $H$ , то из условия  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$  следует, что  $K \in \Theta(G)$ . Из свойств подгруппового функтора  $\Theta$  получаем, что  $K = K \cap H \in \Theta(H)$ . Отсюда  $H \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Следовательно,  $\mathfrak{X}_\Theta$  — наследственная формация. Лемма доказана.

**Лемма 3.5.** Пусть  $\pi$  — характеристика подгруппового ЕТР-функтора  $\Theta$ . Тогда  $\mathfrak{N}_\pi \subseteq \mathfrak{X}_\Theta$ .

**Доказательство.** Пусть  $p \in \pi$ . Тогда ввиду леммы 3.3  $\Theta(P) = S(P)$  для любой  $p$ -подгруппы  $P$ , а значит,  $P \in \mathfrak{X}_\Theta$ . В силу леммы 3.4 класс  $\mathfrak{X}_\Theta$  замкнут относительно прямых произведений с конечным числом сомножителей. Значит,  $\mathfrak{N}_\pi \subseteq \mathfrak{X}_\Theta$ . Лемма доказана.

**Лемма 3.6.** Пусть  $\Theta$  — подгрупповой ЕТР-функтор. Тогда и только тогда  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ , когда  $1 \in \Theta(G)$  и  $P \in \Theta(G)$  для любой силовской подгруппы  $P$  группы  $G$ .

**Доказательство.** Пусть  $P \in \Theta(G)$  для любой силовской подгруппы  $P$  группы  $G$ . Из  $1 \in \Theta(G)$  и свойств функтора  $\Theta$  следует, что  $1 = 1 \cap P \in \Theta(P)$ . Но тогда по лемме 3.3  $\Theta(P) = S(P)$  для любой силовской подгруппы группы  $G$ . Отсюда и из транзитивности  $\Theta$  следует, что  $S(P) \subseteq \Theta(G)$  для любой силовской подгруппы  $P$  из  $G$ . Пусть  $H$  — произвольная подгруппа из  $G$ . Так как  $H$  порождается своими силовскими подгруппами, ввиду решеточности  $\Theta$  и теоремы Силова получаем, что  $H \in \Theta(G)$ . Следовательно,  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Обратное утверждение очевидно. Лемма доказана.

**Лемма 3.7.** Пусть  $\Theta$  — подгрупповой ЕТР-функтор. Предположим, что  $G = [P]\langle A, B \rangle$ , где  $P$  —  $p$ -подгруппа, а  $\langle A, B \rangle$  —  $q$ -группа,  $p$  и  $q$  — различные простые числа. Если  $PA \in \mathfrak{X}_\Theta$  и  $PB \in \mathfrak{X}_\Theta$ , то  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ .

**Доказательство.** Пусть группа  $G = [P]\langle A, B \rangle$  удовлетворяет условию леммы. Тогда  $P$  — силовская  $p$ -подгруппа, а  $\langle A, B \rangle$  — силовская  $q$ -подгруппа группы  $G$  соответственно. Из  $PA \in \mathfrak{X}_\Theta$  и наследственности формации  $\mathfrak{X}_\Theta$  следует, что  $\{p, q\} \subseteq \pi(\mathfrak{X}_\Theta)$ . Согласно лемме 3.5  $P \in \mathfrak{X}_\Theta$  и  $\langle A, B \rangle \in \mathfrak{X}_\Theta$ .

Из  $G/P \in \mathfrak{X}_\Theta$  вытекает, что  $PA/P \in \Theta(G/P)$ . Отсюда  $PA \in \Theta(G)$ . Из  $PA \in \mathfrak{X}_\Theta$  следует, что  $P \in \Theta(PA)$  и  $A \in \Theta(PA)$ . Но тогда ввиду транзитивности  $\Theta$  получаем, что  $A \in \Theta(G)$  и  $P \in \Theta(G)$ . Аналогично  $B \in \Theta(G)$ . В силу решеточности  $\Theta$  имеем  $\langle A, B \rangle \in \Theta(G)$ . Теперь результат вытекает из леммы 3.6. Лемма доказана.

**Лемма 3.8.** Пусть  $\Theta$  — подгрупповой ЕТР-функтор и  $R$  —  $p$ -замкнутая  $\{p, q\}$ -группа Шмидта, причем  $\Phi(R) = 1$ . Если  $R \in \mathfrak{X}_\Theta$ , то  $\mathfrak{X}_\Theta$  содержит все расширения  $p$ -групп с помощью циклических  $q$ -групп.

**Доказательство.** Известно [3], что существует единственная (с точностью до изоморфизма)  $p$ -замкнутая  $\{p, q\}$ -группа Шмидта с единичной подгруппой Фраттини. Поэтому  $R = [N]Z_q$ , где  $N$  — единственная минимальная нормальная подгруппа в  $R$ , а  $Z_q$  — подгруппа простого порядка  $q$ .

Вначале докажем, что формация  $\mathfrak{X}_\Theta$  содержит все расширения  $p$ -групп с помощью групп простого порядка  $q$ . Рассмотрим группу  $G = PZ_q$ , где  $P$  —  $p$ -группа и  $P \triangleleft G$ . Индукцией по порядку  $G$  докажем, что  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ .

Рассмотрим случай, когда  $Z_q \triangleleft G$ . Тогда  $G = P \times Z_q$ . Из  $R \in \mathfrak{X}_\Theta$  и наследственности класса  $\mathfrak{X}_\Theta$  следует, что  $\{p, q\} \subseteq \pi(\mathfrak{X}_\Theta)$ . По лемме 3.5  $\mathfrak{N}_\pi \subseteq \mathfrak{X}_\Theta$ , где  $\pi = \pi(\mathfrak{X}_\Theta)$ . Это означает, что  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Поэтому в дальнейшем будем считать, что подгруппа  $Z_q$  ненормальна в  $G$ .

Пусть  $K$  — минимальная нормальная подгруппа группы  $G$ . Предположим, что  $K \neq P$ . Ясно, что  $K \subseteq P$  и  $KZ_q \neq G$ . По индукции  $G/K \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Поэтому  $Z_qK/K \in \Theta(G/K)$ . Отсюда  $KZ_q \in \Theta(G)$ . Так как  $|KZ_q| < |G|$ , то  $KZ_q \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Отсюда  $Z_q \in \Theta(G)$ . Из  $G/P \in \mathfrak{X}_\Theta$  вытекает, что  $P/P \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Значит,  $P \in \Theta(G)$ . Таким образом, любая силовская подгруппа из  $G$  содержится в  $\Theta(G)$ . Кроме того, из  $P \in \Theta(G)$  и  $Z_q \in \Theta(G)$  следует, что  $1 = P \cap Z_q \in \Theta(G)$ . Теперь, применяя лемму 3.6, получаем, что  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ .

Будем считать далее, что  $K = P$ . Но тогда  $G$  является группой Шмидта и  $\Phi(G) = 1$ . Следовательно,  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$  по условию. Итак, доказано, что всякое расширение  $p$ -группы с помощью групп простого порядка  $q$  принадлежит формации  $\mathfrak{X}_\Theta$ .

Пусть теперь  $G$  — расширение  $p$ -группы с помощью циклической группы порядка  $q^n$ . Тогда группу  $G$  можно представить в виде  $G = PZ_{q^n}$ , где  $P$  —  $p$ -группа,  $P \triangleleft G$  и  $Z_{q^n}$  — циклическая  $q$ -группа.

Докажем индукцией по  $n$ , что  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Как показано выше, утверждение для  $n = 1$  выполняется. Пусть  $n > 1$ . Рассмотрим группу  $E = Pwr(Z_qwrZ_{q^{n-1}})$ . По теореме 18.9 из [4] группа  $G$  изоморфна некоторой подгруппе из  $E$ . Пусть  $B$  — база сплетения  $Z_qwrZ_{q^{n-1}}$ . Тогда  $Z_qwrZ_{q^{n-1}} = [B]Z_{q^{n-1}}$ . Обозначим через  $P^*$  силовскую  $p$ -подгруппу группы  $E$ . Тогда  $E = [P^*]([B]Z_{q^{n-1}})$ . Так как  $E/P^* \simeq [B]Z_{q^{n-1}} \in \mathfrak{X}_\Theta$ , то  $P^*Z_{q^{n-1}}/P^* \in \Theta(E/P^*)$ . Отсюда следует, что  $P^*Z_{q^{n-1}} \in \Theta(E)$ . По индукции  $P^*Z_{q^{n-1}} \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Отсюда вытекает, что  $Z_{q^{n-1}} \in \Theta(P^*Z_{q^{n-1}})$  и  $P^* \in \Theta(P^*Z_{q^{n-1}})$ . Но тогда в силу транзитивности  $\Theta$  получаем, что  $Z_{q^{n-1}} \in \Theta(E)$  и  $P^* \in \Theta(E)$ .

Аналогично  $P^*B/P^* \in \Theta(E/P^*)$ . Отсюда  $P^*B \in \Theta(E)$ . Так как  $B \simeq Z_q \times \dots \times Z_q$ , то, используя предположение индукции (случай  $n = 1$ ) и лемму 3.7, нетрудно видеть, что  $P^*B \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Но тогда  $B \in \Theta(P^*B)$ . Из транзитивности  $\Theta$  следует, что  $B \in \Theta(E)$ . Так как  $\Theta$  — решеточный функтор, то  $\langle B, Z_{q^{n-1}} \rangle = [B]Z_{q^{n-1}} \in \Theta(E)$ . По лемме 3.6  $E \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Из наследственности  $\mathfrak{X}_\Theta$  получаем, что  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Лемма доказана.

**Лемма 3.9.** Пусть  $\mathfrak{X}$  — наследственная формация. Если  $G \in M(\mathfrak{X})$ , то  $G^{\mathfrak{X}}$  является примарной группой.

**Доказательство.** Пусть  $G \in M(\mathfrak{X})$ . Предположим, что группа  $G$  нильпотентна. Если  $G$  непримарна, то из  $\mathfrak{X} = D_0\mathfrak{X}$  и строения  $G$  следует, что  $G \in \mathfrak{X}$ . Получили противоречие с  $G \in M(\mathfrak{X})$ . Значит,  $G$  — примарная группа и утверждение леммы в этом случае выполняется.

Пусть группа  $G$  ненильпотентна. Тогда  $F(G) \neq G$ . Так как согласно утверждению с) теоремы 10.6 из [4]  $\Phi(G)$  — собственная подгруппа из  $F(G)$ , найдутся простое число  $p \in \pi(F(G))$  и силовская  $p$ -подгруппа  $P$  из  $F(G)$  такие, что  $P \not\subseteq \Phi(G)$ . Но тогда  $G = PM$ , где  $M$  — некоторая максимальная подгруппа из  $G$ . Из  $G \in M(\mathfrak{X})$  следует, что  $M \in \mathfrak{X}$ , а значит,  $G/P \in \mathfrak{X}$ . Тем самым  $G^{\mathfrak{X}} \subseteq P$ . Лемма доказана.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО УТВЕРЖДЕНИЯ 1 ТЕОРЕМЫ. Пусть  $\Theta$  — подгрупповой ЕТР-функтор. По лемме 3.4 класс  $\mathfrak{X}_\Theta$  является наследственной формацией. Установим локальность  $\mathfrak{X}_\Theta$ .

Пусть  $G \in M(\mathfrak{X}_\Theta)$ . Если группа  $G$  нильпотентна, то нетрудно видеть, что  $G$  —  $p$ -группа, где  $p$  — некоторое простое число. Ввиду леммы 3.5  $\mathfrak{N}_\pi \subseteq \mathfrak{X}_\Theta$ , где  $\pi = \pi(\mathfrak{X}_\Theta)$ . Поэтому  $G$  — группа простого порядка  $p$ , где  $p$  не принадлежит  $\pi(\mathfrak{X}_\Theta)$ .

Пусть группа  $G$  ненильпотентна. По лемме 3.9  $G^{\mathfrak{X}_\Theta}$  является  $p$ -группой, где  $p$  — некоторое простое число и  $p \in \pi(\mathfrak{X}_\Theta)$ . Обозначим  $G^{\mathfrak{X}_\Theta} = N$ .

Предположим вначале, что  $NS \neq G$  для любой силовской подгруппы  $S$  группы  $G$ . Тогда из  $G/N \in \mathfrak{X}_\Theta$  следует, что  $SN/N \in \Theta(G/N)$ . Отсюда получаем, что  $SN \in \Theta(G)$ . Так как  $SN \neq G$  и  $G \in M(\mathfrak{X}_\Theta)$ , то  $SN \in \mathfrak{X}_\Theta$ , а значит,  $S \in \Theta(SN)$ . Отсюда и из транзитивности  $\Theta$  следует, что  $S \in \Theta(G)$ . Так как  $G$  ненильпотентна, то  $G$  непримарна. Отсюда следует, что  $1 = \cap S$  ( $S$  пробегает все силовские подгруппы из  $G$ ) является  $\Theta$ -подгруппой в  $G$ . Теперь ввиду леммы 3.6 имеем, что  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Получили противоречие с условием  $G \in M(\mathfrak{X}_\Theta)$ .

Пусть  $G = NS$  для некоторой силовской подгруппы  $S$  группы  $G$ . Из ненильпотентности  $G$  вытекает, что  $S$  —  $q$ -группа, где  $q$  — некоторое простое число, отличное от  $p$ . Следовательно,  $G$  является  $p$ -замкнутой  $\{p, q\}$ -группой. Если  $S$  — нециклическая группа, то  $S = \langle A, B \rangle$ , где  $A$  и  $B$  — различные собственные подгруппы из  $S$ . Учитывая, что  $NA \neq G$  и  $NB \neq G$ , имеем  $NA \in \mathfrak{X}_\Theta$  и  $NB \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Тогда по лемме 3.7 получаем, что  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Снова пришли к противоречию с условием  $G \in M(\mathfrak{X}_\Theta)$ .

Значит,  $S$  — циклическая  $q$ -группа. Так как  $G$  ненильпотентна, то в  $G$  найдется подгруппа  $H$ , которая является группой Шмидта. Из  $p$ -замкнутости группы  $G$  вытекает  $p$ -замкнутость  $H$ . Пусть вначале  $H$  — собственная подгруппа в  $G$ . Так как  $\mathfrak{X}_\Theta = Q\mathfrak{X}_\Theta$ , то  $H/\Phi(H) \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Следовательно, по лемме 3.8  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Противоречие. Поэтому остается только случай, когда  $G$  — группа Шмидта.

Итак, доказано, что любая группа из  $M(\mathfrak{X}_\Theta)$  либо группа Шмидта, либо имеет простой порядок. Применяя теорему 2.2, получаем локальность формации  $\mathfrak{X}_\Theta$ . Утверждение 1 теоремы доказано.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО УТВЕРЖДЕНИЯ 2 ТЕОРЕМЫ. Из доказательства утверждения 1 теоремы следует, что класс  $\mathfrak{X}_\Theta$  является локальной наследственной  $\tilde{S}$ -формацией. Тогда по теореме 2.3  $\mathfrak{X}_\Theta$  имеет такой локальный экран  $f$ , что  $f(p) = \mathfrak{S}_{\pi(f(p))}$  для  $p \in \pi(\mathfrak{F})$ ;  $f(p) = \emptyset$  для  $p \in \pi'(\mathfrak{F})$  и, кроме того,  $f(p) = \mathfrak{N}_p f(p)$  для любого простого  $p$ .

Если  $\pi(\mathfrak{X}_\Theta) = \{p\}$ , то  $\mathfrak{X}_\Theta = \mathfrak{N}_p$ . В этом случае утверждение 2) теоремы выполняется.

Пусть  $|\pi(\mathfrak{X}_\Theta)| > 1$  и  $p$  и  $q$  — некоторые различные простые числа из  $\pi(\mathfrak{X}_\Theta)$ . Предположим, что  $q \in \pi(f(p))$ . Докажем, что  $p \in \pi(f(q))$ . Допустим противное, т. е. что  $p \notin \pi(f(q))$ . Рассмотрим точный неприводимый  $F_p[Z_q]$ -модуль  $U$  над полем  $F_p$ , состоящим из  $p$  элементов. Такой модуль существует по теореме 10.3 из [4]. Рассмотрим группу  $E = [U]Z_q$ . Нетрудно видеть, что  $E \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Так как  $O_q(E) = 1$  и  $U$  — единственная минимальная нормальная подгруппа группы  $E$ , то по теореме 10.3 из [4] существует точный неприводимый  $F_q[E]$ -модуль  $W$  над полем  $F_q$ . Рассмотрим группу  $F = [W]E = [W]([U]Z_q)$ . Поскольку  $W$  — минимальная нормальная подгруппа в  $F$  и  $W \cap E = 1$ , то  $E$  — максимальная подгруппа группы  $F$ . Так как  $C_F(W) = F_q(F) = W$  и  $F/W \notin f(q)$ , то группа  $F$

формации  $\mathfrak{X}_\Theta$  не принадлежит. Ясно, что  $F^{\mathfrak{X}_\Theta} = W$ .

Из построения  $F$  вытекает, что в  $F$  имеется точно три класса максимальных подгрупп:  $H_1 = E$ ,  $H_2 = [W]Z_q$  и  $H_3 = [W]U$ .

Из  $F/W \in \mathfrak{X}_\Theta$  следует, что  $H_i/W \in \Theta(F/W)$ ,  $i = 2, 3$ . Отсюда  $H_i \in \Theta(F)$ ,  $i = 2, 3$ . Покажем, что  $H_1 \in \Theta(F)$ . Заметим, что  $N_E(Z_q) = Z_q$ . Поэтому найдется такой элемент  $x \in E$ , что  $Z_q \neq Z_q^x$ . Тогда  $E = \langle Z_q, Z_q^x \rangle$ . Из  $F/W \in \mathfrak{X}_\Theta$  следует, что  $Z_qW/W \in \Theta(F/W)$ , откуда  $Z_qW \in \Theta(F)$ . Так как  $Z_qW$  — примарная  $q$ -группа, а  $\mathfrak{X}_\Theta$  — локальная формация и  $q \in \pi(\mathfrak{X}_\Theta)$ , то  $Z_qW \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Это означает, что  $Z_q \in \Theta(Z_qW)$ . Ввиду транзитивности  $\Theta$  получаем, что  $Z_q \in \Theta(E)$ , а значит,  $Z_q^x \in \Theta(E)$ . Но тогда  $E = \langle Z_q, Z_q^x \rangle \in \Theta(F)$ . Таким образом,  $H_i \in \Theta(F)$  для  $i = 1, 2, 3$ . Отсюда следует, что силовские подгруппы  $H_2$  и  $H_1 \cap H_3$  группы  $F$  входят в  $\Theta(F)$ . Поэтому по лемме 3.6 имеем  $F \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Получили противоречие. Таким образом, из  $q \in \pi(f(p))$  следует, что  $p \in \pi(f(p))$ .

Воспользуемся этим свойством, чтобы доказать более сильное утверждение: если  $q \in \pi(f(p))$ , то  $\pi(f(p)) = \pi(f(q))$ , что влечет  $f(p) = f(q)$ . Пусть  $r \neq q$  и  $r \in \pi(f(p)) \setminus \pi(f(q))$ . Рассмотрим точный неприводимый  $F_r[Z_p]$ -модуль над полем  $F_r$  и группу  $X = [U]Z_p$ . Так как  $r \in \pi(f(p))$ , то  $r \in \pi(\mathfrak{X}_\Theta)$ . Используя доказанное выше утверждение, получаем, что  $p \in \pi(f(r))$ . Пусть  $L$  — точный неприводимый  $F_q[X]$ -модуль над полем  $F_q$ . Рассмотрим группу  $G = [L]([U]Z_p)$ . Группа  $G$  не принадлежит формации  $\mathfrak{X}_\Theta$ , так как  $G/F_q(G) \simeq [U]Z_p \notin f(q)$ . Ясно, что  $L = G^{\mathfrak{X}_\Theta}$ . В  $G$  имеется точно три класса максимальных подгрупп:  $M_1 = [U]Z_p$ ,  $M_2 = [L]U$  и  $M_3 = [L]Z_p$ . Рассуждая, как и выше, можно доказать, что  $M_i \in \Theta(G)$ ,  $i = 1, 2, 3$ . Отсюда следует, что  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Получили противоречие. Таким образом, если  $q \in \pi(f(p))$ , то  $\pi(f(p)) = \pi(f(q))$ . Из строения экрана  $f$  следует, что  $f(p) = f(q)$ . Более того, если найдется простое число  $r \in \pi(f(p)) \cap \pi(f(q))$ , то также  $f(p) = f(q)$ .

Итак, для любых  $p$  и  $q$  либо  $f(p) = f(q)$ , либо  $f(p) \cap f(q) = (1)$ . Поэтому существует разбиение  $\{\pi_i \mid i \in I\}$  множества  $\pi(\mathfrak{X}_\Theta)$  в объединение попарно не пересекающихся подмножеств, т. е.  $\pi(\mathfrak{X}_\Theta) = \bigcup_{i \in I} \pi_i$ , где  $\pi_l \cap \pi_k = \emptyset$  для любых

$l \neq k$  из  $I$ , причем  $p, q \in \pi_i$  тогда и только тогда, когда  $\pi(f(p)) = \pi(f(q))$ .

Обозначим  $\mathfrak{X}^* = D_0(\bigcup_{i \in I} \mathfrak{S}_{\pi_i})$ . Докажем, что  $\mathfrak{X}^* = \mathfrak{X}_\Theta$ . Из полученных выше свойств экрана  $f$  следует, что  $f(p) = \mathfrak{S}_{\pi(f(p))} \subseteq \mathfrak{X}_\Theta$ , т. е.  $f$  — максимальный внутренний экран формации  $\mathfrak{X}_\Theta$ . Так как  $\mathfrak{X}_\Theta = D_0\mathfrak{X}_\Theta$ , то  $\mathfrak{X}^* \subseteq \mathfrak{X}_\Theta$ . Предположим, что множество  $\mathfrak{X}_\Theta \setminus \mathfrak{X}^*$  непусто, и пусть  $G$  — группа наименьшего порядка из  $\mathfrak{X}_\Theta \setminus \mathfrak{X}^*$ . По лемме 2.3  $\mathfrak{X}^*$  — локальная формация, значит, в  $G$  имеется единственная минимальная нормальная подгруппа  $N = G^{\mathfrak{X}^*}$ , причем  $N$  —  $p$ -группа,  $N = F_p(G)$  и  $G = [N]M$ , где  $M$  — некоторая максимальная подгруппа группы  $G$ , принадлежащая  $\mathfrak{X}^*$ . Так как  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ , то  $G/F_p(G) = G/N \simeq M \in f(p)$ , т. е.  $\pi(M) \subseteq \pi(f(p))$ . Но тогда  $G \in f(p) = \mathfrak{S}_{\pi(f(p))}$ . Из построения формации  $\mathfrak{X}^*$  следует, что  $G \in \mathfrak{X}^*$ . Получили противоречие. Следовательно,  $\mathfrak{X}_\Theta = \mathfrak{X}^*$ . Утверждение 2 теоремы доказано.

Прежде чем доказать утверждение 3 теоремы, сформулируем несколько утверждений, устанавливающих связь между множествами подгрупп  $\Theta(G)$  и  $\text{sn}_{\mathfrak{X}_\Theta}(G)$ .

**Лемма 3.10.** Пусть  $\Theta$  — подгрупповой ЕТР-функтор. Если  $M$  —  $\mathfrak{X}_\Theta$ -нормальная максимальная подгруппа группы  $G$ , то  $M \in \Theta(G)$ .

**Доказательство.** Так как  $M \supseteq G^{\mathfrak{X}_\Theta}$ , из определения класса  $\mathfrak{X}_\Theta$  следует, что  $M/G^{\mathfrak{X}_\Theta} \in \Theta(G/G^{\mathfrak{X}_\Theta})$ . Но тогда  $M \in \Theta(G)$ . Лемма доказана.



**Лемма 3.11.** Пусть  $\Theta$  — подгрупповой ЕТР-функтор. Если подгруппа  $H$   $\mathfrak{X}_\Theta$ -субнормальна в  $G$ , то  $H \in \Theta(G)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку  $H$   $\mathfrak{X}_\Theta$ -субнормальна в  $G$ , существует максимальная цепь

$$H = H_0 \subset H_1 \subset \dots \subset H_n = G$$

такая, что  $H_{i-1} \supseteq H_i^{\mathfrak{X}_\Theta}$  для всех  $i = 1, 2, \dots, n$ . Ввиду леммы 3.10 имеем, что  $H_{i-1} \in \Theta(H_i)$  для всех  $i = 1, 2, \dots, n$ . Используя теперь транзитивность функтора  $\Theta$ , заключаем, что  $H \in \Theta(G)$ . Лемма доказана.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Пусть  $\Theta$  — подгрупповой функтор. Собственная подгруппа  $H$  группы  $G$  называется  $\Theta$ -максимальной, если  $H \in \Theta(G)$  и всегда из  $H \subseteq K \subseteq G$  и  $K \in \Theta(G)$  следует, что либо  $K = H$ , либо  $K = G$ .

**Лемма 3.12.** Пусть  $\Theta$  — подгрупповой функтор. Если  $H$  —  $\Theta$ -максимальная подгруппа группы  $G$ , то  $H$  максимальна в  $G$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что  $H$  не максимальна в  $G$ . Пусть  $M$  — максимальная подгруппа группы  $G$ , содержащая  $H$ . Пусть  $C = \text{Core}_G(M)$  и  $K/C$  — главный фактор группы  $G$ . Заметим, что  $G = MK$  и  $M \cap K = C$ . Рассмотрим два случая.

1. Пусть  $C \subseteq H$ . Допустим, что  $HK = G$ . Тогда из  $H \subseteq M$  и  $M \cap K = C$  следует, что  $H = M$ , т. е.  $H$  — максимальная подгруппа группы  $G$ . Пришли к противоречию. Значит,  $HK \neq G$ . Тогда из определения подгруппового функтора получаем, что  $HK/K \in \Theta(G/K)$ , а следовательно,  $HK \in \Theta(G)$ . Так как  $K$  не содержится в  $H$ , то  $H \subset HK$ . Кроме того,  $HK \subset G$ . Пришли к противоречию с тем, что  $H$  —  $\Theta$ -максимальная подгруппа группы  $G$ .

2. Пусть  $C$  не входит в  $H$ . Тогда  $H \subset HC \subseteq M \subset G$  и  $HC \in \Theta(G)$ . Снова пришли к противоречию. Лемма доказана.

**Лемма 3.13.** Пусть  $\Theta$  — подгрупповой ЕТР-функтор. Если  $H$  — собственная подгруппа группы  $G$  и  $H \in \Theta(G)$ , то существует такая максимальная цепь  $H = H_0 \subset H_1 \subset \dots \subset H_n = G$ , что  $H_i \in \Theta(G)$  для всех  $i = 1, 2, \dots, n$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $G$  — группа наименьшего порядка, для которой лемма не верна. Заключим  $H$  в  $\Theta$ -максимальную подгруппу  $M$  группы  $G$ . Ввиду леммы 3.12  $M$  — максимальная подгруппа группы  $G$ . В силу свойств функтора  $\Theta$  из  $H \in \Theta(G)$  следует, что  $H \in \Theta(M)$ . Из  $|M| < |G|$  заключаем, что существует максимальная цепь  $H = M_0 \subset M_1 \subset \dots \subset M_t = M$ , в которой  $M_i \in \Theta(M)$  для всех  $i = 1, 2, \dots, t$ . Так как функтор  $\Theta$  транзитивен, из  $M \in \Theta(G)$  следует, что  $M_i \in \Theta(G)$  для всех  $i = 1, 2, \dots, t$ . Значит, цепь

$$H = M_0 \subset M_1 \subset \dots \subset M_t = M \subset G$$

искомая. Лемма доказана.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО УТВЕРЖДЕНИЯ 3 ТЕОРЕМЫ. Необходимо доказать, что  $\Theta(G) = \text{sp}_{\mathfrak{X}_\Theta}(G)$  для любой группы  $G$ . Включение  $\text{sp}_{\mathfrak{X}_\Theta}(G) \subseteq \Theta(G)$  следует из леммы 3.11.

Установим справедливость обратного включения. Пусть  $G$  — группа наименьшего порядка, для которой включение  $\Theta(G) \subseteq \text{sp}_{\mathfrak{X}_\Theta}(G)$  не выполняется. Если  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ , то очевидно, что  $\text{sp}_{\mathfrak{X}_\Theta}(G) = \Theta(G)$ . Следовательно,  $G \notin \mathfrak{X}_\Theta$ . Ввиду свойств функторов  $\Theta$  и  $\text{sp}_{\mathfrak{X}_\Theta}$ , а также леммы 3.13 можно считать, что в  $G$  имеется максимальная подгруппа  $M$  такая, что  $M \in \Theta(G)$ , но  $M$  не является  $\mathfrak{X}_\Theta$ -нормальной. Вначале предположим, что  $\text{Core}_G(M) \neq 1$ . Тогда  $M/\text{Core}_G(M) \in$

$\Theta(G/\text{Core}_G(M))$ , а значит, ввиду выбора  $G$  имеем

$$M/\text{Core}_G(M) \in \text{sn}_{\mathfrak{X}_\Theta}(G/\text{Core}_G(M)).$$

Отсюда получаем, что  $M \in \text{sn}_{\mathfrak{X}_\Theta}(G)$ . Пришли к противоречию с выбором  $G$ .

Следовательно,  $\text{Core}_G(M) = 1$ . В этом случае по теореме 15.2 из [4]  $G = [N]M$ , где  $N$  — единственная минимальная нормальная подгруппа в  $G$ ,  $N = C_G(N) = F(G)$ ,  $|N| = p^\alpha$ ,  $p$  — простое число.

Предположим, что  $M$  не является группой простого порядка. Пусть  $Q$  — произвольная подгруппа простого порядка из  $M$ . Рассмотрим подгруппу  $NQ$ . Из  $M \in \Theta(G)$  и свойств функтора  $\Theta$  следует, что  $NQ \cap M = Q(N \cap M) = Q \in \Theta(NQ)$ . Отсюда и из  $|NQ| < |G|$  выводим, что  $Q \in \text{sn}_{\mathfrak{X}_\Theta}(NQ)$ . Заметим, что  $(NQ)^{\mathfrak{X}_\Theta} \subseteq N \in \mathfrak{N}$ . Ввиду теоремы 15.10 из [3] имеем, что  $NQ \in \mathfrak{X}_\Theta$ . В силу утверждения 2 теоремы  $\mathfrak{X}_\Theta = D_0(\bigcup_{i \in I} \mathfrak{S}_{\pi_i})$ , где  $\bigcup_{i \in I} \pi_i = \pi(\mathfrak{X}_\Theta)$  и  $\pi_k \cap \pi_l = \emptyset$  для всех  $l \neq k$  из  $I$ . Будем считать, что  $p \in \pi_{i_0}$  для некоторого номера  $i_0 \in I$ . Пусть  $\pi(Q) = q$  и  $q \in \pi_{i_1}$ , где  $i_1 \neq i_0$ . Тогда из  $NQ \in \mathfrak{X}_\Theta$  и строения формации  $\mathfrak{X}_\Theta$  вытекает, что  $NQ = N \times Q$ . Это означает, что  $Q \subseteq C_{NQ}(N) \subseteq C_G(N) = N$ . Получили противоречие. Следовательно,  $q \in \pi_{i_0}$ . Таким образом, доказано, что  $\pi(G) \subseteq \pi_{i_0}$ , а значит,  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Снова получили противоречие.

Остается принять, что  $G = [N]M$ , где  $M$  — группа простого порядка  $q \neq p$ . Так как функтор  $\Theta$  является решеточным и  $M \in \Theta(G)$ , то  $1 = \text{Core}_G(M) \in \Theta(G)$ . Ввиду леммы 3.3  $S(N) \subseteq \Theta(G)$ . Учитывая теперь, что  $M \in \Theta(G)$ ,  $G \in \Theta(G)$  и  $\Theta$  согласован с автоморфизмами группы  $G$ , получаем  $\Theta(G) = S(G)$ . Таким образом,  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ ; противоречие. Теорема доказана.

#### 4. Заключительные замечания. Открытые вопросы

В работе [7] в универсуме конечных разрешимых групп описаны наследственные локальные формации, обладающие решеточным свойством. Предлагаемый нами функторный подход позволяет отбросить условие локальности, существенно используемое при доказательстве основного результата работы [7].

**Следствие 1.** Пусть  $\mathfrak{F}$  — наследственная формация. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- 1)  $\mathfrak{F}$  обладает решеточным свойством;
- 2)  $\mathfrak{X}_{\text{sn}_{\mathfrak{F}}} = D_0(\bigcup_{i \in I} \mathfrak{S}_{\pi_i})$ , где  $\bigcup_{i \in I} \pi_i = \pi(\mathfrak{F})$  и  $\pi_k \cap \pi_l = \emptyset$  для всех  $k \neq l$  из  $I$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть формация  $\mathfrak{F}$  обладает решеточным свойством. Тогда согласно леммам 2.1 и 2.2 функтор  $\Theta = \text{sn}_{\mathfrak{F}}$  является подгрупповым ЕТР-функтором. Теперь утверждение 2 следует из доказанной выше теоремы.

Так как  $\text{sn}_{\mathfrak{F}} = \text{sn}_{\mathfrak{H}}$  для  $\mathfrak{H} = \mathfrak{X}_{\text{sn}_{\mathfrak{F}}}$ , то импликация 2)  $\rightarrow$  1) следует из теоремы 2.1. Следствие доказано.

Заметим, что при доказательстве лемм 3.1–3.8, 3.10, 3.11 мы не использовали условие разрешимости групп. Применяя эти утверждения, в универсуме всех конечных групп можно получить

**Следствие 2.** Пусть  $\Theta$  — подгрупповой ЕТР-функтор. Тогда

- 1) класс  $\mathfrak{X}_\Theta$  — наследственная композиционная формация;
- 2)  $\text{sn}_{\mathfrak{X}_\Theta}(G) \subseteq \Theta(G)$  для любой группы  $G$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Согласно лемме 3.4  $\mathfrak{X}_\Theta$  — формация. Установим композиционность  $\mathfrak{X}_\Theta$ . Для этого ввиду теоремы 4.17 из [4] достаточно показать,

что  $\mathfrak{X}_\Theta$  — разрешимо-насыщенная формация, т. е. из  $G/\Phi(G_\mathfrak{S}) \in \mathfrak{X}_\Theta$  всегда вытекает, что  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ , где  $G_\mathfrak{S}$  — разрешимый радикал группы  $G$ .

Пусть  $\Phi = \Phi(G_\mathfrak{S})$  и  $G/\Phi \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Рассмотрим подгруппу  $PG_\mathfrak{S}$ , где  $P$  — произвольная силовская подгруппа группы  $G$ . Сужение функтора  $\Theta$  на класс  $\mathfrak{S}$  также ЕТР-функтор. Поэтому согласно утверждению 1 теоремы формация  $\mathfrak{X}_\Theta \cap \mathfrak{S}$  локальна, а значит, насыщена. Поэтому из  $PG_\mathfrak{S}/\Phi \in \mathfrak{X}_\Theta \cap \mathfrak{S}$  и  $\Phi \subseteq \Phi(PG_\mathfrak{S})$  следует, что  $PG_\mathfrak{S} \in \mathfrak{X}_\Theta \cap \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{X}_\Theta$ . Отсюда и из наследственности  $\mathfrak{X}_\Theta$  получаем, что  $P\Phi \in \mathfrak{X}_\Theta$ , тем самым  $P \in \Theta(P\Phi)$ . Из  $P\Phi/\Phi \in \Theta(G/\Phi)$  следует, что  $P\Phi \in \Theta(G)$ . Из транзитивности  $\Theta$  имеем  $P \in \Theta(G)$ . Но тогда по лемме 3.6  $G \in \mathfrak{X}_\Theta$ . Следовательно,  $\mathfrak{X}_\Theta$  — композиционная формация.

Утверждение 2 вытекает из леммы 3.11. Следствие доказано.

Ввиду следствия 2 возникают два вопроса.

**Вопрос 1.** *Описать наследственные композиционные формации  $\mathfrak{F}$ , для которых функтор  $\text{sn}_{\mathfrak{F}}$  является ЕТР-функтором.*

**Вопрос 2.** *Пусть  $\Theta$  — подгрупповой ЕТР-функтор. Существует ли такая композиционная наследственная формация  $\mathfrak{F}$ , что  $\Theta(G) = \text{sn}_{\mathfrak{F}}(G)$  для всякой группы  $G$ ?*

Если  $\mathfrak{F}$  — наследственная формация, то функтор  $\Theta = \text{sn}_{\mathfrak{F}}$  является естественным транзитивным функтором (кратко, ЕТ-функтором). Поэтому возникает следующий вопрос.

**Вопрос 3.** *Пусть  $\Theta$  — подгрупповой ЕТ-функтор, заданный на классе всех групп (всех разрешимых групп). Существует ли такая наследственная формация  $\mathfrak{F}$ , что  $\Theta(G) = \text{sn}_{\mathfrak{F}}(G)$  для всякой группы  $G$ ?*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Wielandt H. Verallgemeinerung der invarianten Untergruppen // Math. Z. 1939. Bd 45. S. 209–244.
2. Kegel O. H. Untergruppenverbände endlicher Gruppen, die Subnormalteilerverband echt enthalten // Arch. Math. 1978. Bd 30. S. 225–228.
3. Шеметков Л. А. Формации конечных групп. М.: Наука, 1978.
4. Doerk K., Hawkes T. Finite soluble groups. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1992.
5. Коуровская тетрадь (нерешенные вопросы теории групп). Новосибирск, 1992.
6. Васильев А. Ф., Каморников С. Ф., Семенчук В. Н. О решетках подгрупп конечных групп // Бесконечные группы и примыкающие алгебраические системы. Киев: Ин-т математики АН Украины, 1993. С. 27–54.
7. Ballester-Boliches A., Doerk K., Perez-Ramos M. D. On the lattice of  $\mathfrak{F}$ -subnormal subgroups // J. Algebra. 1992. V. 148. P. 42–52.
8. Плоткин Б. И. Радикалы в группах, операции на классах групп и радикальные классы // Избранные вопросы алгебры и логики. Новосибирск: Наука, 1973. С. 205–244.
9. Скиба А. Н. Об одном классе локальных формаций конечных групп // Докл. АН БССР. 1990. Т. 34, № 11. С. 382–385.
10. Семенчук В. Н., Васильев А. Ф. Характеризация локальных формаций  $\mathfrak{F}$  по заданным свойствам минимальных не  $\mathfrak{F}$ -групп // Исследование нормального и подгруппового строения конечных групп. Минск: Наука и техника, 1984. С. 175–181.

*Статья поступила 19 октября 1999 г.*

г. Гомель

Гомельский гос. университет им. Ф. Скорины

vasiljev@gsu.unibel.by; kamornikov@gsu.unibel.by