

УДК 517.95

О РАЗРЕШИМОСТИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ
С НЕЛИНЕЙНОЙ ДИССИПАЦИЕЙ
В НЕЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ
А. И. Кожанов, Н. А. Ларькин

Аннотация: В нецилиндрической области $Q = \{(x, t) : 0 < t < T, 0 < x < \alpha(t)\}$ изучается разрешимость некоторых аналогов первой начально-краевой задачи для уравнений $u_{tt} - u_{xx} + \beta(u, u_t) = f(x, t)$. Функция $\beta(u, u_t)$ здесь моделирует функцию $a(u)|u_t|^p u_t$, $a(u) \geq 0$, $p \geq 0$, для функции $\alpha(t)$, определяющей область Q , выполняются условие $\alpha(t) > 0$ при $t \in [0, T]$ и одно из условий $0 \leq \alpha'(t) \leq \alpha_0 < 1$, $-1 < -\alpha_0 \leq \alpha'(t) \leq 0$, $\alpha'(t) \geq \alpha_0 > 1$. Наряду с доказательством теорем существования регулярных решений изучаемых краевых задач, в работе приводятся некоторые результаты о поведении энергетической нормы решения при $t \rightarrow +\infty$. Библиогр. 16.

Введение

Цель настоящей работы — изложение новых результатов о разрешимости и свойствах решений краевых задач для волнового уравнения с нелинейной диссипацией (нелинейными младшими членами, зависящими от производной решения) в некоторых нецилиндрических областях.

Разрешимость краевых задач для линейных и нелинейных гиперболических уравнений в нецилиндрических областях изучалась в ряде работ. Ж.-Л. Лионс [1, 2] предложил использовать для исследования таких задач метод штрафа. Реализуя эту идею, Л. А. Медейрос [3] доказал существование слабых решений аналога первой начально-краевой задачи в нецилиндрической области для уравнения

$$u_{tt} - \Delta u + \beta(u) = f \quad (*)$$

в случае выполнения условия $\xi\beta(\xi) \geq 0$. Близкие результаты получены также в работах [4–8]. Существование регулярных решений аналога первой краевой задачи для уравнений типа уравнения (*) доказывалось в работах [9, 10]. Если же младшие члены представляют собой функцию, зависящую также от производной u_t , то здесь можно отметить лишь работу [11]. В ней доказано существование слабого решения аналога первой краевой задачи в некоторых расширяющихся с ростом t областях для волнового уравнения с младшими членами, зависящими от производной, при наличии ограничений на порядок роста.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 99–01–00620) и Министерства общего и профессионального образования России (первый автор) и фонда $CNPq$ -Brasil (второй автор).

Наряду с вопросом о разрешимости краевых задач для гиперболических уравнений в нецилиндрических областях большой интерес вызывает также вопрос о поведении решений этих задач при $t \rightarrow \infty$ (см. [11, 12]).

Опишем вкратце полученные авторами результаты.

Для одномерного волнового уравнения с диссипацией, моделирующей функцию $a(\xi)|\eta|^p\eta$, $a(\xi) \geq 0$, $p \geq 0$, в области с правой криволинейной границей, описываемой уравнением $x = \alpha(t)$, и прямолинейной левой доказано существование регулярного решения непосредственного аналога первой начально-краевой задачи при выполнении условия $0 \leq \alpha'(t) \leq \alpha_0 < 1$. В той же области для одномерного волнового уравнения с диссипацией $\beta(u_t)$ доказано существование регулярных решений краевой задачи с заданием на линии $x = \alpha(t)$ значения производной u_t . Существование регулярных решений той же задачи доказано для одномерного волнового уравнения с общей диссипацией в областях, для которых выполняется условие $-1 < -\alpha_0 \leq \alpha'(t) \leq 0$. Наконец, для одномерного волнового уравнения с общей диссипацией в сильно расширяющихся областях, т. е. в областях, для которых выполняется условие $\alpha'(t) \geq \alpha_0 > 1$, доказано существование регулярных решений аналога задачи Коши.

В случае расширяющихся областей в некоторых случаях в работе описано поведение энергетической нормы решения на сечениях $t = \text{const}$ при $t \rightarrow \infty$.

В статье используются общепринятые обозначения. Буквами C , K , M с индексами обозначаются постоянные, не зависящие от элементов рассматриваемого множества; при этом фраза «постоянная ... зависит от функции...» означает, что данная постоянная зависит от величин, определяемых той или иной функцией, которые конечны вследствие выполнения наложенных условий.

§ 1. Разрешимость аналогов первой начально-краевой задачи для одномерного волнового уравнения с нелинейной диссипацией

Пусть $\alpha(t)$, $t \in [0, T]$, — непрерывная функция такая, что $\alpha(0) = 1$, $\alpha(t) > 0$ для всех t . Определим множества $Q_t = \{(x, \tau) : 0 < \tau < t, 0 < x < \alpha(\tau)\}$ и $D_t = \{(x, \tau) : 0 < x < \alpha(\tau), \tau = t\}$.

В области Q_T рассмотрим уравнение

$$Lu \equiv u_{tt} - u_{xx} + \beta(u, u_t) = f(x, t) \quad (1.1)$$

и следующие краевые задачи для него.

Краевая задача I. Найти решение уравнения (1.1), удовлетворяющее условиям

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x), \quad x \in D_0, \quad (1.2)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=\alpha(t)} = 0, \quad 0 < t < T. \quad (1.3)$$

Краевая задача II. Найти решение уравнения (1.1), удовлетворяющее условиям (1.2) и условиям

$$u|_{x=0} = 0, \quad u_t|_{x=\alpha(t)} = 0, \quad 0 < t < T. \quad (1.4)$$

Краевая задача I является непосредственным аналогом первой начально-краевой задачи для волнового уравнения в цилиндрической области. Краевая задача II в случае, если область Q_T — цилиндрическая область, эквивалентна

первой начально-краевой задаче, однако в нецилиндрической области это уже не так.

Отметим, что краевые задачи с условием (1.4) для нелинейного волнового уравнения в нецилиндрических областях ранее не изучались.

Исследование разрешимости краевых задач I и II начнем со случая «расширяющихся областей».

Обозначим $v_1(x) = u_1(x) + \alpha'(0)xu_{0x}(x)$.

Теорема 1.1. Пусть выполняются следующие условия.

I. $\alpha(t) \in C^2([0, T])$, $0 \leq \alpha'(t) \leq \alpha_0 < 1$, $t \in [0, T]$.

II. $\beta(\xi, \eta) \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $\beta(\xi, 0) \equiv 0$, $\eta\beta(\xi, \eta) \geq 0 \forall (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$.

III. $u_0(x) \in W_2^2(D_0) \cap \overset{\circ}{W}_\infty^1(D_0)$, $u_1(x) \in W_2^1(D_0)$, $v_1(x) \in \overset{\circ}{W}_2^1(D_0)$, $f(x, t) \in W_2^1(Q_T) \cap L_\infty(Q_T)$.

Тогда существует решение $u(x, t)$ краевой задачи I такое, что $u \in L_\infty(0, T; W_2^2(D_t) \cap \overset{\circ}{W}_2^1(D_t))$, $u_t \in L_\infty(0, T; W_2^1(D_t))$, $u_{tt} \in L_\infty(0, T; L_2(D_t))$.

Доказательство. В цилиндре $\widehat{Q}_T = \{(z, t) : 0 < z < 1, 0 < t < T\}$ рассмотрим краевую задачу: найти решение уравнения

$$\widehat{L}v \equiv l_0 l_0 v - \frac{1}{\alpha^2(t)} v_{zz} + \beta(v, l_0 v) = \widehat{f}(z, t), \quad (1.1')$$

где $l_0 v = v_t - \frac{\alpha'(t)z}{\alpha(t)} v_z$, $\widehat{f}(z, t) = f(\alpha(t)z, t)$, удовлетворяющее условиям

$$v(z, 0) = u_0(z), \quad v_t(z, 0) = v_1(z), \quad 0 < z < 1, \quad (1.2')$$

$$v|_{z=0} = v|_{z=1} = 0, \quad 0 < t < T. \quad (1.3')$$

Оператор \widehat{L} в цилиндре \widehat{Q}_T строго гиперболичен. Тогда при выполнении условий гладкости на функции $\alpha(t)$, $\beta(\xi, \eta)$, $u_0(x)$, $u_1(x)$ и $f(x, t)$, указанных в условиях теоремы, задача (1.1')–(1.3') будет иметь локальное регулярное решение. Для того же, чтобы эта задача имела регулярное решение во всем цилиндре \widehat{Q}_T , достаточно установить нужные априорные оценки.

Рассмотрим равенство

$$\int_0^t \int_0^1 \widehat{L}v \cdot l_0 v \, dz d\tau = \int_0^t \int_0^1 \widehat{f} \cdot l_0 v \, dz d\tau.$$

Интегрируя по частям, используя равенство $l_0 v|_{z=1} = -\frac{\alpha'(\tau)}{\alpha(\tau)} v_z(1, \tau)$ и применяя лемму Гронуолла, нетрудно установить, что при выполнении условий теоремы будет иметь место первая априорная оценка

$$\int_0^1 [l_0 v(z, t)]^2 dz + \int_0^1 v_z^2(z, t) dz \leq K_1, \quad (1.5)$$

где $t \in [0, T]$, постоянная K_1 зависит лишь от функций $f(x, t)$, $u_0(x)$, $u_1(x)$, $\alpha(t)$ и числа T .

Следствием оценки (1.5) является оценка

$$\operatorname{vrai} \max_{0 \leq z \leq 1, 0 \leq t \leq T} |v(z, t)| \leq K_2. \quad (1.6)$$

Пусть q — произвольное натуральное нечетное число. Рассмотрим равенство

$$\int_0^t \int_0^1 \widehat{L}v \left[\left(l_0 v + \frac{1}{\alpha(\tau)} v_z \right)^q + \left(l_0 v - \frac{1}{\alpha(\tau)} v_z \right)^q \right] dz d\tau = \int_0^t \int_0^1 \widehat{f} \cdot \left[\left(l_0 v + \frac{1}{\alpha(\tau)} v_z \right)^q + \left(l_0 v - \frac{1}{\alpha(\tau)} v_z \right)^q \right] dz d\tau. \quad (1.7)$$

Учитывая представление

$$l_0 l_0 v - \frac{1}{\alpha^2(t)} v_{zz} = \left(l_0 \pm \frac{1}{\alpha(t)} \frac{\partial}{\partial z} \right) \left(l_0 \mp \frac{1}{\alpha(t)} \frac{\partial}{\partial z} \right) v$$

и интегрируя в (1.7), преобразуем его к виду

$$\begin{aligned} & \frac{1}{q+1} \int_0^1 [w_1^{q+1}(z, t) + w_2^{q+1}(z, t)] dz + \frac{1}{q+1} \int_0^t \frac{1}{\alpha(\tau)} [w_1^{q+1}(0, \tau) - w_2^{q+1}(0, \tau)] d\tau \\ & - \frac{1}{q+1} \int_0^t \left\{ \frac{\alpha'(\tau)}{\alpha(\tau)} [w_1^{q+1}(1, \tau) + w_2^{q+1}(1, \tau)] + \frac{1}{\alpha(\tau)} [w_1^{q+1}(1, \tau) - w_2^{q+1}(1, \tau)] \right\} d\tau \\ & + \frac{1}{q+1} \int_0^t \int_0^1 \frac{\alpha'(\tau)}{\alpha(\tau)} [w_1^{q+1} + w_2^{q+1}] dz d\tau + \int_0^t \int_0^1 \beta(v, l_0 v) [w_1^q + w_2^q] dz d\tau \\ & = \frac{1}{q+1} \int_0^1 [w_1^{q+1}(z, 0) + w_2^{q+1}(z, 0)] dz + \int_0^t \int_0^1 \widehat{f} [w_1^q + w_2^q] dz d\tau, \quad (1.8) \end{aligned}$$

где для краткости обозначено $w_1 = l_0 v + \frac{1}{\alpha(t)} v_z$, $w_2 = l_0 v - \frac{1}{\alpha(t)} v_z$.

Вследствие условий (1.3') имеют место равенства

$$\begin{aligned} w_1(0, \tau) &= \frac{1}{\alpha(\tau)} v_z(0, \tau), & w_2(0, \tau) &= -\frac{1}{\alpha(\tau)} v_z(0, \tau), \\ w_1(1, \tau) &= -\frac{\alpha'(\tau) - 1}{\alpha(\tau)} v_z(1, \tau), & w_2(1, \tau) &= -\frac{\alpha'(\tau) + 1}{\alpha(\tau)} v_z(1, \tau). \end{aligned}$$

Поскольку $q + 1$ — четное число, отсюда получаем

$$w_1^{q+1}(0, \tau) - w_2^{q+1}(0, \tau) = 0, \quad (1.9)$$

$$\begin{aligned} & \frac{\alpha'(\tau)}{\alpha(\tau)} [w_1^{q+1}(1, \tau) + w_2^{q+1}(1, \tau)] + \frac{1}{\alpha(\tau)} [w_1^{q+1}(1, \tau) - w_2^{q+1}(1, \tau)] \\ & = \frac{1}{\alpha(\tau)} \{ w_1^{q+1}(1, \tau) \cdot [\alpha'(\tau) + 1] + w_2^{q+1}(1, \tau) [\alpha'(\tau) - 1] \} \\ & = \frac{v_z^{q+1}(1, \tau)}{\alpha^{q+2}(\tau)} \{ [\alpha'(\tau) + 1][\alpha'(\tau) - 1]^{q+1} + [\alpha'(\tau) - 1][\alpha'(\tau) + 1]^{q+1} \} \\ & = \frac{v_z^{q+1}(1, \tau)}{\alpha^{q+2}(\tau)} [\alpha'^2(\tau) - 1] \{ [\alpha'(\tau) + 1]^q + [\alpha'(\tau) - 1]^q \}. \end{aligned}$$

Используя формулу бинома Ньютона и учитывая условие I, нетрудно убедиться в справедливости неравенства

$$[\alpha'(\tau) - 1]^q + [\alpha'(\tau) + 1]^q \geq 0, \quad \tau \in [0, T].$$

Еще раз учитывая условие I, получаем неравенство

$$\frac{\alpha'(\tau)}{\alpha(\tau)} [w_1^{q+1}(1, \tau) + w_2^{q+1}(1, \tau)] + \frac{1}{\alpha(\tau)} [w_1^{q+1}(1, \tau) - w_2^{q+1}(1, \tau)] \leq 0, \quad (1.10)$$

справедливое для всех чисел $\tau \in [0, T]$. Далее, для любых действительных чисел ξ, η_1, η_2 и для нечетного числа q вследствие условия II будет выполняться неравенство

$$\beta(\xi, \eta_1)[(\eta_1 + \eta_2)^q + (\eta_1 - \eta_2)^q] \geq 0. \quad (1.11)$$

Действительно, при $\eta_1 = 0$ это неравенство справедливо (ввиду условия $\beta(\xi, 0) \equiv 0$). Имеет место неравенство

$$\eta_1[\eta_1 + \eta_2]^q + (\eta_1 - \eta_2)^q \geq 2|\eta_1|^{q+1} \geq 0$$

(в истинности его легко убедиться, используя формулу бинома Ньютона). Если теперь $\eta_1 \neq 0$, то требуемое неравенство (1.11) вытекает из равенства

$$\beta(\xi, \eta_1)[(\eta_1 + \eta_2)^q + (\eta_1 - \eta_2)^q] = \frac{\beta(\xi, \eta_1)}{\eta_1} \eta_1[(\eta_1 + \eta_2)^q + (\eta_1 - \eta_2)^q],$$

предыдущего неравенства и условия II.

Обозначим

$$M_1 = \operatorname{vrai} \max_{0 \leq z \leq 1} |v_1(z) - \alpha'(0)z u_0'(z) + u_0'(z)|,$$

$$M_2 = \operatorname{vrai} \max_{0 \leq z \leq 1} |v_1(z) - \alpha'(0)z u_0'(z) - u_0'(z)|, \quad M = \operatorname{vrai} \max_{0 \leq z \leq 1, 0 \leq t \leq T} |\hat{f}(z, t)|$$

(эти числа конечны вследствие условия III).

Равенство (1.9), неравенства (1.10) и (1.11), неравенство Юнга и лемма Гронуолла позволяют на основе равенства (1.8) вывести оценку

$$\int_0^1 [w_1^{q+1}(z, t) + w_2^{q+1}(z, t)] dz \leq [M_1^{q+1} + M_2^{q+1} + TM^{q+1}] \exp(qT),$$

из которой вытекает оценка

$$\left\{ \int_0^1 [w_1^{q+1}(z, t) + w_2^{q+1}(z, t)] dz \right\}^{\frac{1}{q+1}} \leq (M_1 + M_2 + MT) \exp T = M_0.$$

Число $q+1$ произвольное положительное четное. Справедливость данной оценки для произвольного четного числа означает, что она будет справедлива и для произвольного положительного большего единицы действительного числа q . Но тогда будут справедливы оценки

$$\operatorname{vrai} \max_{0 \leq z \leq 1} |w_1(z, t)| \leq M_0, \quad \operatorname{vrai} \max_{0 \leq z \leq 1} |w_2(z, t)| \leq M_0$$

для почти всех чисел t из отрезка $[0, T]$.

Из доказанных оценок вытекает ограниченность (почти всюду в \widehat{Q}_T) величин $|l_0v|$, $|v_z|$, $|v_t|$. Действительно, имеем

$$\begin{aligned} |l_0v| &= \left| \frac{1}{2}(w_1 + w_2) \right| \leq \frac{1}{2}(|w_1| + |w_2|) \leq M_0, \\ \left| \frac{v_z}{\alpha(t)} \right| &= \left| \frac{1}{2}(w_1 - w_2) \right| \leq \frac{1}{2}(|w_1| + |w_2|) \leq M_0, \\ |v_t| &= \left| l_0v + \frac{\alpha'(t)z}{\alpha(t)}v_z \right| \leq |l_0v| + \frac{\alpha'(t)}{\alpha(t)}|v_z|. \end{aligned}$$

Из этих неравенств и вытекает требуемая ограниченность.

Рассмотрим равенство

$$\int_0^t \int_0^1 (\widehat{L}v)_\tau v_{\tau\tau} dz d\tau = \int_0^t \int_0^1 \widehat{f}_\tau v_{\tau\tau} dz d\tau. \tag{1.12}$$

Из условий теоремы следует оценка

$$\int_0^1 v_{tt}^2(z, 0) dz \leq K_3$$

с постоянной K_3 , зависящей лишь от функций $f(x, t)$, $u_0(x)$, $u_1(x)$ и $\alpha(t)$. Используя эту оценку, ограниченность функций v , l_0v , v_z и v_t , условия теоремы и применяя стандартную технику доказательства второй априорной оценки для гиперболических уравнений, нетрудно показать, что из равенства (1.12) вытекает неравенство

$$\int_0^1 [v_{tt}^2(z, t) + v_{zt}^2(z, t)] dz \leq K_4, \tag{1.13}$$

где $t \in [0, T]$, постоянная K_4 зависит лишь от функций $f(x, t)$, $u_0(x)$, $u_1(x)$, $\alpha(t)$ и числа T .

Последняя требуемая оценка

$$\int_0^1 v_{zz}^2(z, t) dz \leq K_5 \tag{1.14}$$

теперь очевидна.

Оценок (1.5), (1.13) и (1.14) вполне достаточно для продолжения функции $v(z, t)$ как решения краевой задачи (1.1')–(1.3') с локального интервала существования на весь интервал $(0, T)$.

Имея регулярное решение $v(z, t)$ краевой задачи (1.1')–(1.3'), нетрудно показать, что функция $u(x, t)$, определенная равенством $u(x, t) = v(\frac{x}{\alpha(t)}, t)$, будет решением краевой задачи I из требуемого класса. Теорема доказана.

Условие II теоремы означает, что функция $\beta(u, u_t)$ в уравнении (1.1) может иметь произвольный рост по производной u_t , может быть вырождающейся диссипацией вида $a(u)|u_t|^p u_t$, $a(u) \geq 0$, и т. п.

Приведем один результат о разрешимости краевой задачи II в случае $\beta(\xi, \eta) \equiv \beta(\eta)$.

Обозначим $u_2(x) = f(x, 0) + u_0''(x) - \beta(u_1(x))$, $v_2(x) = u_2(x) + \alpha'(0)xu_1'(x)$.

Теорема 1.2. Пусть выполняются следующие условия.

I. $\alpha(t) \in C^3([0, T])$, $0 \leq \alpha'(t) \leq \alpha_0 < 1$; $t \in [0, T]$.

II. $\beta(\xi, \eta) \equiv \beta(\eta) \in C^2(\mathbb{R})$, $\beta'(\eta) \geq 0$, $\eta \in \mathbb{R}$.

III. $u_0(x) \in W_2^3(D_0) \cap W_\infty^2(D_0)$, $u_0(0) = 0$, $u_1(x) \in W_2^2(D_0) \cap \dot{W}_\infty^1(D_0)$, $v_2(x) \in \dot{W}_2^1(D_0)$, $f(x, t) \in L_\infty(Q_T)$, $f_t(x, t) \in W_2^1(Q_T) \cap L_\infty(Q_T)$.

Тогда существует решение $u(x, t)$ краевой задачи II такое, что $u \in L_\infty(0, T; W_2^2(D_t))$, $u_t \in L_\infty(0, T; W_2^2(D_t) \cap \dot{W}_2^1(D_t))$, $u_{tt} \in L_\infty(0, T; W_2^1(D_t))$, $u_{ttt} \in L_\infty(0, T; L_2(D_t))$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В области Q_T рассмотрим краевую задачу: найти решение уравнения

$$u_{ttt} - u_{xxt} + \beta'(u_t)u_{tt} = f_t, \quad (1.15)$$

удовлетворяющее условиям

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x), \quad u_{tt}(x, 0) = u_2(x), \quad x \in D_0, \quad (1.16)$$

$$u|_{x=0} = 0, \quad u_t|_{x=\alpha(t)} = 0, \quad 0 < t < T. \quad (1.17)$$

Если эту краевую задачу рассматривать как краевую задачу I для функции $w = u_t$, то все условия теоремы 1.1 для нее окажутся выполненными. Другими словами, функция $w = u_t$ вполне определена и будет принадлежать указанному в теореме 1.1 классу.

Построим по функции $w(x, t)$ функцию $u(x, t)$. В цилиндре $\bar{Q}_0 = \bar{D}_0 \times (0, T)$ положим $u(x, t) = \int_0^t w(x, \tau) d\tau + u_0(x)$. Заметим, что

$$u(1, t) = \int_0^t w(1, \tau) d\tau + u_0(1) = \varphi(t), \quad u_x(1, t) = \int_0^t w_x(1, \tau) d\tau + u'_0(1) = \psi(t).$$

Определим функцию $u(x, T)$ при $x > 1$ как решение задачи Коши

$$u_{xx}(x, T) = w_t(x, T) + \beta(w(x, T)) - f(x, T), \quad (1.18)$$

$$u(1, T) = \varphi(T), \quad u_x(1, T) = \psi(T). \quad (1.19)$$

Отметим, что при $t = T$ все слагаемые в правой части уравнения (1.18) определены, в том числе и в точке $x = 1$.

Наконец, положим при $x > 1$, $t < T$

$$u(x, t) = - \int_t^T w(x, \tau) d\tau + u(x, T).$$

Непосредственно из построения функции $u(x, t)$ следует, что всюду в области Q_T будет выполняться равенство $u_t = w$. Интегрируя уравнение (1.15) по переменной t , нетрудно убедиться, что при $0 < x \leq 1$, $0 < t < T$ уравнение (1.1) для функции $u(x, t)$ будет выполняться. Если же $x > 1$, то

$$u_{xx}(x, t) = - \int_t^T w_{xx}(x, \tau) d\tau + u_{xx}(x, T).$$

Выражая функцию $w_{xx}(x, \tau)$ из уравнения (1.15), функцию $u_{xx}(x, T)$ из уравнения (1.18) и интегрируя, нетрудно убедиться, что и в области $\{1 < x < \alpha(t), 0 < t < T\}$ функция $u(x, t)$ будет удовлетворять уравнению (1.1).

Выполнение условий (1.2) и (1.4) очевидным образом вытекает из выполнения условий (1.16) и (1.17) и из вида функции $u_2(x)$. Теорема доказана.

Для «сужающихся» областей авторам удалось доказать существование регулярных решений лишь для краевой задачи II.

Теорема 1.3. Пусть выполняются следующие условия.

I. $\alpha(t) \in C^3([0, T])$, $-1 < \alpha_0 \leq \alpha'(t) \leq 0$, $t \in [0, T]$.

II. $\beta(\xi, \eta) \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $\beta(\xi, 0) \equiv 0$, $\eta\beta(\xi, \eta) \geq 0$, $|\beta_\xi(\xi, \eta)| \leq C(1 + |\xi|^p + |\eta|^p)$, $|\beta_\eta(\xi, \eta)| \leq C(1 + |\xi|^p + |\eta|^p)$, $p \geq 1$, $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$.

III. $u_0(x) \in W_2^2(D_0) \cap W_\infty^1(D_0)$, $u_0(0) = 0$, $u_1(x) \in W_2^2(D_0) \cap \overset{\circ}{W}_2^1(D)$, $f(x, t) \in W_2^1(Q_T) \cap L_\infty(Q_T)$.

Тогда существует решение $u(x, t)$ краевой задачи II такое, что $u \in L_\infty(0, T; W_2^2(D_t))$, $u_t \in L_\infty(0, T; \overset{\circ}{W}_2^1(D_t))$, $u_{tt} \in L_\infty(0, T; L_2(D_t))$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В цилиндре \hat{Q}_T рассмотрим семейство краевых задач: найти решение уравнения

$$\hat{L}_\varepsilon v \equiv l_0 l_0 v - \frac{1}{\alpha^2(t)} v_{zz} + \beta(v, l_0 v) - \varepsilon v_{zzt} = \hat{f}, \tag{1.1'}$$

где $\varepsilon > 0$, удовлетворяющее условиям (1.2') и условиям

$$v|_{z=0} = l_0 v|_{z=1} = 0, \quad 0 < t < T. \tag{1.4'}$$

Данная краевая задача представляет собой краевую задачу для псевдогиперболического уравнения третьего порядка с заданием на правой боковой стенке связи между производными v_t и v_z . Подобные задачи исследованы (даже в более сложной ситуации) в работах [13, 14]. Чтобы иметь возможность повторить технику этих работ и далее перейти к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$, установим априорные оценки регулярных решений задачи (1.1'_\varepsilon), (1.2'), (1.4').

Рассмотрим равенство

$$\int_0^t \int_0^1 \hat{L}_\varepsilon v \cdot l_0 v \, dz d\tau = \int_0^t \int_0^1 \hat{f} l_0 v \, dz d\tau.$$

Интегрируя по частям, используя условия теоремы и применяя лемму Гронолла, нетрудно получить неравенство

$$\int_0^t [l_0 v(z, t)]^2 \, dz + \int_0^1 v_z^2(z, t) \, dz + \varepsilon \int_0^t \int_0^1 v_{z\tau}^2 \, dz d\tau \leq C_1 \left[1 + \varepsilon \int_0^t \int_0^1 v_{zz}^2 \, dz d\tau \right], \tag{1.20}$$

где $t \in [0, T]$ и постоянная C_1 зависит лишь от функций $f(x, t)$, $u_0(x)$, $u_1(x)$, $\alpha(t)$ и числа T . Поскольку же функция $v(z, t)$ обращается в нуль при $z = 0$, то из неравенства (1.20) вытекает неравенство

$$\text{vrai max}_{0 \leq z \leq 1} |v(z, t)| \leq C_2 [1 + \sqrt{\varepsilon} \left(\int_0^t \int_0^1 v_{zz}^2 \, dz dt \right)^{1/2}]. \tag{1.21}$$

Рассмотрим равенство

$$-\int_0^t \int_0^1 \widehat{L}_\varepsilon v \cdot v_{zz\tau} dz d\tau = -\int_0^t \int_0^1 \widehat{f} v_{zz\tau} dz d\tau. \quad (1.22)$$

Обозначим для краткости

$$h(z, t) = \frac{\alpha'^2(t)z}{\alpha^2(t)} - \left(\frac{\alpha'(t)}{\alpha(t)} \right)_t z.$$

Интегрируя по частям, преобразуем равенство (1.22) к виду

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_0^1 \left[v_{zt}^2(z, t) + \frac{1 - \alpha'^2(t)z^2}{\alpha^2(t)} v_{zz}^2(z, t) \right] dz + \varepsilon \int_0^t \int_0^1 v_{zz\tau}^2 dz d\tau \\ &= \int_0^t \int_0^1 \left[\frac{\alpha'(\tau)}{\alpha(\tau)} v_{z\tau}^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1 - \alpha'^2(\tau)z^2}{\alpha^2(\tau)} \right)_\tau v_{zz}^2 - \beta_\xi(v, l_0 v) v_z v_{z\tau} - \beta_\eta(v, l_0 v) v_{zz}^2 \right. \\ &+ \left. \frac{\alpha'(\tau)z}{\alpha(\tau)} \beta_\eta(v, l_0 v) v_{zz} v_{z\tau} + \frac{\alpha'(\tau)}{\alpha(\tau)} \beta_\eta(v, l_0 v) v_z v_{z\tau} - h_z v_z v_{z\tau} - h v_{zz} v_{z\tau} + \widehat{f}_\tau v_{zz} \right] dz d\tau \\ &+ \int_0^t \left[v_{\tau\tau}(1, \tau) v_{z\tau}(1, \tau) - \frac{\alpha'(\tau)}{\alpha(\tau)} v_{z\tau}^2(1, \tau) + h(1, \tau) v_z(1, \tau) v_{z\tau}(1, \tau) \right] d\tau \\ &- \int_0^1 \widehat{f}(z, t) v_{zz}(z, t) dz + \frac{1}{2} \int_0^t \left\{ v_{1z}^2(z) + [1 - \alpha'^2(0)z^2] u_{0zz}^2(z) \right\} dz + \int_0^1 \widehat{f}(z, 0) u_{0zz}(z) dz. \end{aligned} \quad (1.23)$$

Используя равенство

$$v_{tt}(1, t) = \frac{\alpha'(t)z}{\alpha(t)} v_{zt}(1, t) + \left(\frac{\alpha'(t)z}{\alpha(t)} \right)_t v_z(1, t)$$

и интегрируя по частям, нетрудно граничный интеграл J по отрезку $[0, t]$ прямой $z = 1$ преобразовать к виду

$$J = \frac{1}{2} \frac{\alpha'^2(t)}{\alpha^2(t)} v_z^2(1, t) - \frac{\alpha'^2(0)}{2} u_{0z}^2(1) - \int_0^t \frac{\alpha'(\tau)}{\alpha(\tau)} \left(\frac{\alpha'(\tau)}{\alpha(\tau)} \right)_\tau v_z^2(1, \tau) d\tau.$$

Поскольку функция $v(z, t)$ обращается в нуль при $z = 0$, имеем

$$\begin{aligned} \operatorname{vrai} \max_{0 \leq z \leq 1} v_z^2(z, t) &\leq \delta \int_0^1 v_{zz}^2(z, t) dz + C(\delta) \int_0^1 v_z^2(x, t), \quad \delta > 0, \\ \operatorname{vrai} \max_{0 \leq z \leq 1} v_t^2(z, t) &\leq \int_0^1 v_{z\tau}^2(z, t) dz. \end{aligned} \quad (1.24)$$

Второе из этих неравенств очевидно. Для доказательства первого нужно рассмотреть функцию $w(z, t) = v(z, t) - zv(1, t)$. Она обращается в нуль при $x = 0$ и $z = 1$, и для нее соответствующее неравенство известно. Неравенство же для функции $v(x, t)$ нетрудно получить из неравенства для функции w .

Условие на рост производных β_ξ и β_η , неравенства (1.20), (1.21) и (1.24), условия на функции $\alpha(t)$, $f(x, t)$, $u_o(x)$ и $u_1(x)$, а также неравенства Гёльдера и Юнга позволяют нам оценить правую часть равенства (1.23) и получить неравенство

$$\int_0^1 [v_{zt}^2(z, t) + v_{zz}^2(z, t)] dz \leq C_3 \left\{ \int_0^t \left(\int_0^1 [v_{z\tau}^2(z, \tau) + v_{zz}^2(z, \tau)] dz \right)^{p_1} d\tau + 1 \right\}, \quad (1.25)$$

где $t \in [0, T]$, постоянная C_3 зависит лишь от исходных данных задачи, число же p_1 определяется лишь числом p ($p_1 \geq p$). Далее, следствием неравенства (1.25) является существование числа t_0 такого, что $0 < t_0 \leq T$ и при $t \in [0, t_0]$ имеет место оценка

$$\int_0^1 [v_{zt}^2(z, t) + v_{zz}^2(z, t)] dz \leq C_4 \quad (1.26)$$

с постоянной C_4 , определяемой лишь с помощью чисел C_3 , p_1 и t_0 (см. [15, с. 43]). Но тогда на отрезке $[0, t_0]$ будут равномерно ограничены и левые части неравенств (1.24). В свою очередь, из этого следует оценка

$$\varepsilon \int_0^t \int_0^1 v_{zz\tau}^2 dz d\tau \leq C_5, \quad (1.27)$$

где по-прежнему $t \in [0, t_0]$ и постоянная C_5 зависит лишь от исходных данных задачи. Наконец, из (1.26) и (1.27) и уравнения (1.1' $_\varepsilon$) вытекает оценка

$$\int_0^t \int_0^1 v_{\tau\tau}^2 dz d\tau \leq C_6. \quad (1.28)$$

Оценок (1.26)–(1.28) вполне достаточно для доказательства существования локального регулярного решения краевой задачи (1.1' $_\varepsilon$), (1.2'), (1.4'). Как отмечено выше, сделать это можно, повторяя технику работ [13, 14].

Заметим, что в неравенствах (1.26)–(1.28) постоянные C_4 – C_6 не зависят от ε . Это позволяет в уравнении (1.1' $_\varepsilon$) на интервале существования локального решения перейти к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$. Осуществив процедуру перехода к пределу, мы получим, что краевая задача II имеет локальное регулярное решение (а именно решение, удовлетворяющее требуемым в теореме 1.3 включениям на локальном интервале).

Для регулярных решений краевой задачи II будут выполняться неравенства (1.20) и (1.21), взятые при $\varepsilon = 0$. Другими словами, будут справедливы первые априорные оценки. Равенство (1.7) с помощью выкладок, аналогичных проделанным при доказательстве теоремы 1.1, приводит к равномерной ограниченности величин $|v_t|$, $|v_z|$. Возвращаясь к (1.23) и используя уже доказанную равномерную ограниченность функции v и ее первых производных, нетрудно вновь получить оценку (1.26), но уже с постоянной в правой части, не зависящей от длины интервала.

Доказанных оценок вполне достаточно для продолжения решения с локального интервала существования на весь интервал $(0, T)$. Переходя от функции $v(z, t)$ к функции $u(x, t)$, завершаем доказательство теоремы 1.3.

§ 2. Аналог задачи Коши для одномерного волнового уравнения в «сильно расширяющихся» областях

Если для кривой $x = \alpha(t)$ выполняется условие $\alpha'(t) > 1$, то она будет кривой пространственного типа. Из общей теории гиперболических уравнений следует, что задача Коши с данными на линии $x = \alpha(t)$ локально разрешима. Это наталкивает на мысль, что и для волнового уравнения с нелинейной диссипацией при выполнении условия $\alpha'(t) > 1$ (т. е. для «сильно расширяющейся» области Q_T) корректной будет задача с заданием на линии $x = \alpha(t)$ двух условий.

Краевая задача III. Найти решение уравнения (1.1), удовлетворяющее условиям (1.2) и условиям

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=\alpha(t)} = u_t|_{x=\alpha(t)} = 0, \quad 0 < t < T. \quad (2.1)$$

Теорема 2.1. Пусть выполняются следующие условия.

I. $\alpha(t) \in C^2([0, T])$, $\alpha'(t) \geq \alpha_0 > 1$, $t \in [0, T]$.

II. $\beta(\xi, \eta) \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $\beta(\xi, 0) \equiv 0$, $\eta\beta(\xi, \eta) \geq 0$, $\beta_\eta(\xi, \eta) \geq 0$, $|\beta_\xi(\xi, \eta)| \leq N_0[\eta\beta(\xi, \eta)\beta_\eta(\xi, \eta)]^{1/2}$, $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$.

III. $u_0(x) \in W_2^2(D_0) \cap \dot{W}_2^1(D_0)$, $u_1(x) \in \dot{W}_2^1(D_0)$, $f(x, t) \in W_2^1(Q_T)$.

Тогда существует решение $u(x, t)$ краевой задачи III такое, что $u \in L_\infty(0, T; W_2^2(D_t)) \cap \dot{W}_2^1(D_t)$, $u_t \in L_\infty(0, T; \dot{W}_2^1(D_t))$, $u_{tt} \in L_\infty(0, T; L_2(D_t))$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В цилиндре \hat{Q}_T рассмотрим семейство краевых задач: найти решение уравнения

$$\hat{L}_\varepsilon v \equiv l_0 l_0 v - \frac{1}{\alpha^2(t)} v_{zz} + \beta(v, l_0 v) - \frac{\varepsilon}{\alpha^2(t)} \frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v = \hat{f}, \quad (1.1''_\varepsilon)$$

где $\varepsilon > 0$, удовлетворяющее условиям (1.2') и условиям

$$v|_{z=0} = v|_{z=1} = l_0 v|_{z=1} = 0, \quad 0 < t < T. \quad (2.1')$$

Для доказательства разрешимости краевой задачи (1.1''_ε), (1.2'), (2.1') применим метод продолжения по параметру. Именно, для чисел λ из отрезка $[0, 1]$ определим оператор

$$\hat{L}_{\varepsilon\lambda} v \equiv l_0 l_0 v - \frac{\lambda}{\alpha^2(t)} v_{zz} + \lambda\beta(v, l_0 v) - \frac{\varepsilon}{\alpha^2(t)} \frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v$$

и рассмотрим краевую задачу: найти решение уравнения

$$\hat{L}_{\varepsilon\lambda} v = \hat{f}, \quad (1.1''_{\varepsilon\lambda})$$

удовлетворяющее условиям (1.2') и (2.1').

Для осуществления схемы метода продолжения по параметру и последующего предельного перехода требуются подходящие априорные оценки. Наличие таких оценок мы сейчас и докажем.

Прежде всего заметим, что из условия (2.1') вытекают равенства

$$v_z(1, t) = 0, \quad \frac{\partial}{\partial z} l_0 v \Big|_{z=1} = -\frac{\alpha'(t)}{\alpha(t)} v_{zz}(1, t), \quad l_0 l_0 v|_{z=1} = \frac{\alpha'^2(t)}{\alpha^2(t)} v_{zz}(1, t). \quad (2.2)$$

Равенство

$$\int_0^t \int_0^1 \widehat{L}_{\varepsilon\lambda} v \cdot l_0 v \, dz d\tau = \int_0^t \int_0^1 \widehat{f} \cdot l_0 v \, dz d\tau$$

приводит к очевидной первой оценке

$$\int_0^1 [l_0 v(z, t)]^2 \, dz + \lambda \int_0^t \int_0^1 \beta(v, l_0 v) l_0 v \, dz d\tau + \varepsilon \int_0^t \int_0^1 \left[\frac{\partial}{\partial z} l_0 v \right]^2 \, dz d\tau \leq N_1, \quad (2.3)$$

где, как и ранее, $t \in [0, T]$, постоянная N_1 зависит лишь от исходных данных задачи и не зависит от чисел ε и λ .

Следующие рассуждения позволят нам получить равномерные по λ оценки для фиксированного числа ε .

Рассмотрим равенство

$$\int_0^t \int_0^1 \widehat{L}_{\varepsilon, \lambda} v \cdot \frac{1}{\alpha^2(\tau)} \frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v \, dz d\tau = \int_0^t \int_0^1 \widehat{f} \cdot \frac{1}{\alpha^2(\tau)} \frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v \, dz d\tau.$$

Интегрируя по частям, из данного равенства нетрудно получить равенство

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\alpha^2(\tau)} \int_0^1 \left[\frac{\partial}{\partial z} l_0 v(z, t) \right]^2 \, dz + \frac{\lambda}{2\alpha^4(t)} \int_0^1 v_{zz}^2(z, t) \, dz + \int_0^t \int_0^1 \left\{ \frac{\alpha'(\tau)}{2\alpha^3(\tau)} \left[\frac{\partial}{\partial z} l_0 v \right]^2 \right. \\ & \left. + \frac{\lambda \alpha'(\tau)}{2\alpha^5(\tau)} v_{zz}^2 + \frac{\lambda \beta_\eta(v, l_0 v)}{\alpha^2(\tau)} \left[\frac{\partial}{\partial z} l_0 v \right]^2 \right\} \, dz d\tau + \varepsilon \int_0^t \int_0^1 \frac{1}{\alpha^4(\tau)} \left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v \right]^2 \, dz d\tau \\ & - \int_0^t \left[\frac{1}{\alpha^2(\tau)} \left(\frac{\partial}{\partial z} l_0 v \right) (1, \tau) (l_0 l_0 v) (1, \tau) + \frac{\alpha'(\tau)}{2\alpha^3(\tau)} \left(\frac{\partial}{\partial z} l_0 v \right)^2 (1, \tau) \right. \\ & \left. + \frac{\lambda \alpha'(\tau)}{2\alpha^5(\tau)} v_{zz}^2(1, \tau) \right] \, d\tau = - \int_0^t \int_0^1 \frac{\lambda \beta_\xi(v, l_0 v)}{\alpha^2(\tau)} v_z \frac{\partial}{\partial z} l_0 v \, dz d\tau \\ & + \int_0^t \int_0^1 \widehat{f} \frac{1}{\alpha^2(\tau)} \frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v \, dz d\tau + \frac{1}{2} \int_0^t u_{1z}^2(z) \, dz + \frac{1}{2} \int_0^1 u_{0zz}^2(z) \, dz. \quad (2.4) \end{aligned}$$

Интеграл по отрезку $[0, t]$ прямой $z = 1$ в левой части равенства (2.4) с помощью равенств (2.2) может быть преобразован к виду

$$\int_0^t \frac{\alpha'(\tau)}{2\alpha^2(\tau)} [\alpha'^2(\tau) - \lambda] v_{zz}^2(1, \tau) \, d\tau;$$

последний же интеграл вследствие условия I оценивается снизу величиной

$$\alpha_1 \int_0^t v_{zz}^2(1, \tau) \, d\tau, \quad \alpha_1 = \alpha_1(\alpha_0, T) > 0.$$

Оценим первое слагаемое правой части равенства (2.4).

Вследствие первого равенства (2.2) для функции $v(z, t)$ имеем

$$\operatorname{vrai} \max_{0 \leq z \leq 1} |v_z(z, t)| \leq \left(\int_0^1 v_{zz}^2(z, t) dz \right)^{1/2}.$$

Используя это неравенство, условие II и неравенство Юнга, нетрудно получить неравенство

$$\begin{aligned} \left| \int_0^t \int_0^1 \frac{\beta_\xi(v, l_0 v)}{\alpha^2(\tau)} v_z \cdot \frac{\partial}{\partial z} l_0 v dz d\tau \right| &\leq \delta \int_0^t \int_0^1 \beta_\eta(v, l_0 v) \left[\frac{\partial}{\partial z} l_0 v \right]^2 dz d\tau \\ &+ N_3 \int_0^t \left(\int_0^1 v_{zz}^2(z, \tau) dz \right) \left(\int_0^1 \lambda \beta(v, l_0 v) l_0 v dz \right) d\tau, \end{aligned} \quad (2.5)$$

где δ — произвольное положительное число, $t \in [0, T]$, постоянная N_3 зависит лишь от исходных данных задачи и от числа δ .

Второе слагаемое правой части равенства (2.4) очевидным образом оценивается величиной

$$\frac{\delta^2}{2} \int_0^t \int_0^1 \frac{1}{\alpha^4(\tau)} \left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v \right]^2 dz d\tau + \frac{1}{2\delta^2} \int_0^T \int_0^1 \hat{f}^2 dz d\tau.$$

Далее, для функции $v(z, t)$ имеет место неравенство

$$\begin{aligned} \int_0^t \int_0^1 \frac{\alpha'(\tau)}{2\alpha^5(\tau)} v_{zz}^2(1, \tau) d\tau &\geq \frac{1}{2\alpha^4(\tau)} \int_0^1 v_{zz}^2(z, t) dz \\ &- \frac{\delta^2}{2} \int_0^t \int_0^1 \frac{1}{\alpha^4(\tau)} \left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v \right]^2 dz d\tau - \frac{1}{2\delta^2} \int_0^t \int_0^1 \frac{1}{\alpha^4(\tau)} v_{zz}^2 dz d\tau - \frac{1}{2} \int_0^1 u_{0zz}^2(z) dz. \end{aligned} \quad (2.6)$$

Чтобы доказать его, проинтегрируем по частям в интеграле

$$\int_0^t \int_0^1 \frac{1}{\alpha^2(\tau)} \frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v \cdot \frac{1}{\alpha^2(\tau)} v_{zz} dz d\tau,$$

воспользуемся равенством

$$\frac{1}{\alpha^2(t)} \frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v = l_0 \left(\frac{1}{\alpha^2(t)} v_{zz} \right)$$

и, наконец, применим неравенство Юнга.

С помощью доказанных неравенств мы можем получить из (2.4) неравенство

$$\begin{aligned} \alpha_2 \int_0^1 v_{zz}^2(z, t) dz + (\varepsilon - \delta^2) \int_0^t \int_0^1 \frac{1}{\alpha^2(\tau)} \left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v \right]^2 dz d\tau \\ \leq N_4 \left\{ \int_0^t \left[\int_0^1 v_{zz}^2(z, \tau) dz \right] \left(\int_0^1 \lambda \beta(v, l_0 v) l_0 v dz \right) + \int_0^1 v_{zz}^2(z, t) dz \right\} d\tau + 1 \Big\}, \end{aligned}$$

где $t \in [0, T]$, постоянная N_4 зависит от исходных данных задачи и от числа δ , постоянная α_2 положительна и определяется лишь функцией $\alpha(t)$ и числом T . Зафиксируем $\delta = \sqrt{\varepsilon}$. Тогда второе слагаемое в левой части последнего неравенства можно отбросить. К полученному неравенству применима лемма Гронуолла, которая приводит к неравенству

$$\int_0^1 v_{zz}^2(z, t) dz \leq N_4 \exp \left\{ N_4 T + N_4 \int_0^t \int_0^1 \lambda \beta(v, l_0 v) l_0 v dz dt \right\}. \quad (2.7)$$

Вследствие (2.3) правая часть неравенства (2.7) будет ограничена постоянной N_5 , зависящей лишь от исходных данных задачи и от ε . Другими словами,

$$\int_0^1 v_{zz}^2(z, t) dz \leq N_5, \quad t \in [0, T]. \quad (2.8)$$

Оценка (2.8) основная. Используя ее, с помощью стандартных приемов нетрудно получить оценки

$$\int_0^1 v_{zt}^2(z, t) dz + \int_0^t \int_0^1 \left\{ \left[\frac{\partial}{\partial \tau} l_0 v \right]^2 + \left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v \right]^2 + v_{\tau\tau}^2 \right\} dz d\tau \leq N_6, \quad (2.9)$$

$$\operatorname{vrai\,max}_{0 \leq z \leq 1, 0 \leq t \leq T} |v| + \operatorname{vrai\,max}_{0 \leq z \leq 1, 0 \leq t \leq T} |v_t| + \operatorname{vrai\,max}_{0 \leq z \leq 1, 0 \leq t \leq T} |v_z| \leq N_7 \quad (2.10)$$

с постоянными N_6 и N_7 , зависящими лишь от исходных данных задачи и от ε .

Рассмотрим краевую задачу: *найти функцию $v(z, t)$, являющуюся в \widehat{Q}_T решением уравнения*

$$l_0 v = w \quad (2.11)$$

и удовлетворяющую условиям

$$v|_{z=0} = v|_{z=1} = 0, \quad v(z, 0) = u_0(z). \quad (2.12)$$

Если функция $w(z, t)$ принадлежит пространству $W_2^1(\widehat{Q}_T)$ и если она обращается в нуль при $z = 0$ и $z = 1$, то краевая задача (2.11), (2.12) будет иметь решение $v(z, t)$ такое, что $v(z, t) \in L_\infty(0, T; \overset{\circ}{W}_2^1(D_0))$, $v_t(z, t) \in L_\infty(0, T; L_2(D_0))$. Доказательство этого факта нетрудно провести, используя параболическое уравнение

$$l_{0,\varepsilon} v \equiv v_t - \varepsilon v_{zz} - \frac{\alpha'(t)z}{\alpha(t)} v_z = w, \quad (2.11_\varepsilon)$$

получая равномерные по ε оценки решений краевой задачи (2.11 $_\varepsilon$), (2.12) (основная оценка получается после анализа равенства $\int_0^t \int_0^1 l_{0,\varepsilon} v \cdot v_{zz} dz d\tau = \int_0^t \int_0^1 w v_{zz} dz d\tau$) и переходя к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Вернемся к краевой задаче (1.1'' $_\lambda$), (1.2'), (2.1').

При $\lambda = 0$ эта задача представляет собой первую краевую задачу относительно функции $w = l_0 v$ для параболического уравнения. Существование регулярного решения такой задачи хорошо известно. Зная же функцию w , как отмечено выше, нетрудно найти и функцию v . Далее, для функции $v(z, t)$ равномерно по λ при принадлежности функции \hat{f} лишь пространству $L_2(\widehat{Q}_T)$ (другими словами, без понижения гладкости) справедливы оценки (2.8)–(2.10). Именно это и позволяет осуществить всю схему метода продолжения по параметру

для краевой задачи (1.1'' $_{\varepsilon\lambda}$), (1.2'), (2.1') и тем самым получить существование регулярных решений этой задачи для всех значений λ из отрезка $[0, 1]$.

Таким образом, существование регулярных решений краевой задачи (1.1'' $_{\varepsilon}$), (1.2'), (2.1') доказано.

Для решений этой краевой задачи имеет место оценка (2.3) для $\lambda = 1$. Далее, опять же для $\lambda = 1$ рассмотрим равенство (2.4). Если мы оценим второе слагаемое правой части этого равенства так же, как ранее, во втором выполним интегрирование по частям и затем применим неравенство Юнга, то в результате получим неравенство

$$\begin{aligned} & \int_0^1 v_{zz}^2(z, t) dz + \varepsilon \int_0^t \int_0^1 \left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v \right]^2 dz d\tau \\ & \leq N_8 \left\{ \int_0^t \left[\left(\int_0^1 v_{zz}^2(z, \tau) dz \right) \left(\int_0^1 \beta(v, l_0 v) l_0 v dz \right) + \int_0^1 v_{zz}^2(z, \tau) dz \right] d\tau + 1 \right\}, \end{aligned}$$

где $t \in [0, T]$ и постоянная N_8 зависит лишь от исходных данных и не зависит от ε . Используя теперь лемму Гронуолла, получаем оценку типа оценки (2.7) и далее оценку типа оценки (2.8), но уже с постоянными в правой части, не зависящими от ε . В свою очередь, из доказанных оценок следуют неравенства

$$\begin{aligned} & \int_0^1 v_{zt}^2(z, t) dz + \varepsilon \int_0^t \int_0^1 \left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} l_0 v \right]^2 dz d\tau \leq N_9, \\ & \text{vrai max}_{0 \leq z \leq 1, 0 \leq t \leq T} |v| + \text{vrai max}_{0 \leq z \leq 1, 0 \leq t \leq T} |v_z| + \text{vrai max}_{0 \leq z \leq 1, 0 \leq t \leq T} |v_t| \leq N_{10} \end{aligned}$$

вновь с постоянными, не зависящими от ε . Наконец, последняя оценка

$$\int_0^t \int_0^1 v_{\tau\tau}^2 dz d\tau \leq N_{11}$$

вытекает из предыдущих.

Доказанных оценок вполне достаточно для перехода к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$ в уравнении (1.1'' $_{\varepsilon}$). Предельная функция будет решением уравнения $\widehat{L}_0 v = \widehat{f}$, и для нее будут выполняться условия (1.2) и (2.1). Кроме того, для предельной функции сохранятся доказанные выше оценки. Из них следует выполнение оценки

$$\int_0^1 [l_0 l_0 v(z, t)]^2 dz \leq N_{12}$$

(для решения $v(z, t)$ уравнения $\widehat{L}v = \widehat{f}$). Переходя от функции $v(z, t)$ к функции $u(x, t)$, окончательно получаем решение краевой задачи III из требуемого класса. Теорема доказана.

Условие подчинения для производной $\beta_{\xi}(\xi, \eta)$ не выполнено для функций $\beta(\xi, \eta)$, представляющих собой вырождающуюся на решении диссипацию. Для таких функций для доказательства разрешимости краевой задачи III потребуются дополнительные условия.

Теорема 2.2. Пусть выполняются условия I и III теоремы 2.1, а также следующее условие.

II'. $\beta(\xi, \eta) \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $\beta(\xi, 0) \equiv 0$, $m_0|\xi|^k|\eta|^{p+2} \leq \eta\beta(\xi, \eta) \leq m_1|\xi|^k|\eta|^{p+2}$, $m_0|\xi|^k|\eta|^p \leq \beta_\eta(\xi, \eta) \leq m_1|\xi|^k|\eta|^p$, $|\beta_\xi(\xi, \eta)| \leq m_2|\xi|^l|\eta|^{p+1}$, $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$, $m_0 > 0$, $p \geq 0$, $2l \geq k \geq 0$.

Тогда существует решение $u(x, t)$ краевой задачи III такое, что $u \in L_\infty(0, T; W_2^2(D_t)) \cap \overset{\circ}{W}_2^1(D_t)$, $u_t \in L_\infty(0, T; \overset{\circ}{W}_2^1(D_t))$, $u_{tt} \in L_\infty(0, T; L_2(D_t))$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В цилиндре \widehat{Q}_T рассмотрим уравнение

$$\widehat{L}_\varepsilon v \equiv l_0 l_0 v - \frac{1}{\alpha^2(t)} v_{zz} + \beta_\varepsilon(v, l_0 v) = \widehat{f}, \tag{2.13}$$

где $\beta_\varepsilon(\xi, \eta) = \beta(\xi, \eta) + \varepsilon|\eta|^p \eta$, $\varepsilon > 0$. Заметим, что для функции $\beta_\varepsilon(\xi, \eta)$ на любом множестве $B_M = \{(\xi, \eta) : |\xi| \leq M, \eta \in R\}$ условие II теоремы 2.1 будет выполнено. Этого вполне достаточно, чтобы краевая задача (2.13), (1.2'), (2.1') имела регулярное решение (поскольку все остальные условия теоремы 2.1 выполняются). Действительно, определим срезку, полагая $\beta_{\varepsilon M}(\xi, \eta)$ равной $\beta_\varepsilon(\xi, \eta)$, если $|\eta| \leq M$, считая ее произвольной функцией из C^1 , если $M < |\eta| \leq M_1$, и равной функции $\beta_\varepsilon(M_1, \eta)$, если $|\eta| > M_1$. Краевая задача III для уравнения (2.13) с такой функцией будет иметь регулярное решение; для этого решения будет справедлива оценка

$$\operatorname{vrai} \max_{0 \leq z \leq 1, 0 \leq t \leq T} |v| \leq M_0 \tag{2.14}$$

с постоянной M_0 , зависящей лишь от исходных данных. Если теперь параметр M срезки выбрать большим числа M_0 , то функция $\beta_{\varepsilon M}(v, l_0 v)$ будет совпадать с функцией $\beta_\varepsilon(v, l_0 v)$, и тем самым решение краевой задачи III для уравнения с функцией $\beta_{\varepsilon M}(v, l_0 v)$ будет решением краевой задачи III для уравнения (2.13).

Заметим, что вследствие условия III и теорем вложения для функций $u_0(x)$, $u_1(x)$ и $f(x, t)$ будут выполняться включения

$$u_{0x}(x) \in L_m(D_0), \quad u_1 \in L_m(D_0), \quad f(x, t) \in L_m(Q_T), \quad m > 1,$$

позволяющие с помощью равенства (1.7) получить оценку

$$\int_0^1 [w_1^{q+1}(z, t) + w_2^{q+1}(z, t)] dz \leq M_2, \tag{2.15}$$

в которой $t \in [0, T]$, q — произвольное натуральное нечетное число, постоянная M_2 зависит лишь от исходных данных задачи и не зависит от ε , функции $w_1(z, t)$ и $w_2(z, t)$ суть функции, введенные при доказательстве теоремы 1.1.

Из оценки (2.15) вытекает очевидная оценка

$$\int_0^1 [l_0 v(z, t)]^{q+1} dz \leq M_2. \tag{2.16}$$

Чтобы получить следующие (основные) оценки, мы должны теперь проанализировать равенство (2.4) (с $\lambda = 1$); при этом в каком-либо пояснении нуждается лишь анализ (точнее говоря, оценка) слагаемого

$$- \int_0^t \int_0^1 \frac{\beta_\xi(v, l_0 v)}{\alpha^2(\tau)} v_z \frac{\partial}{\partial z} l_0 v dz d\tau.$$

Это слагаемое можно оценить так:

$$\begin{aligned} & \left| - \int_0^t \int_0^1 \frac{\beta_\xi(v, l_0 v)}{\alpha^2(\tau)} v_z \frac{\partial}{\partial z} l_0 v \, dz d\tau \right| \leq \delta \int_0^t \int_0^1 |v|^k |l_0 v|^p \left[\frac{\partial}{\partial z} l_0 v \right]^2 \, dz d\tau \\ & \quad + C_1(\delta) \int_0^t \int_0^1 |v|^{2l-k} |l_0 v|^{p+2} v_z^2 \, dz d\tau \\ & \leq \delta \int_0^t \int_0^1 |v|^k |l_0 v|^p \left[\frac{\partial}{\partial z} l_0 v \right]^2 \, dz d\tau + C_1(\delta) \int_0^t \left(\int_0^1 v_{zz}^2(z, \tau) \, dz \right) \left(\int_0^1 |l_0 v(z, \tau)|^{p+2} \, dz \right) d\tau \\ & \leq \delta \int_0^t \int_0^1 |v|^k |l_0 v|^p \left[\frac{\partial}{\partial z} l_0 v \right]^2 \, dz d\tau + C_2(\delta) \int_0^t \int_0^1 v_{zz}^2(z, \tau) \, dz d\tau \end{aligned}$$

(по ходу выкладок здесь использовалось условие Π' , оценки (2.14) и (2.16) со специальным выбором числа q).

Доказательство требуемых оценок завершается так же, как завершалось доказательство равномерных по ε оценок теоремы 2.1. В результате мы получим оценки (2.8)–(2.10), но с постоянными в правой части, не зависящими от ε . Этих оценок вполне достаточно для предельного перехода при $\varepsilon \rightarrow 0$ в уравнении (2.13); предельная функция и будет требуемым решением краевой задачи III. Теорема доказана.

§ 3. О поведении решений при $t \rightarrow \infty$

В настоящем параграфе приведем несколько простых теорем о поведении при $t \rightarrow \infty$ решений той или иной краевой задачи для уравнения (1.1) в расширяющихся с ростом t областях. В формулировках этих теорем мы не будем повторять условия теорем существования; как легко можно будет понять из нижеизложенного, условия, при которых будут справедливы эти теоремы, не будут противоречить условиям теорем существования. Другими словами, объединяя условия теорем существования и теорем настоящего пункта, мы сможем описать свойства реально существующего решения.

Итак, пусть $Q_\infty = \{(x, t) : t > 0, 0 < x < \alpha(t)\}$, и пусть эта область расширяется с ростом t . Заметим прежде всего, что если Q_∞ расширяется ограниченным образом (т. е. так, что выполняется условие $\alpha(t) \leq \bar{\alpha}_0 < +\infty$, $t \geq 0$), и выполняются условия теоремы 1.1, то для регулярных решений краевой задачи I будет иметь место оценка

$$\operatorname{vrai} \max_{0 \leq x \leq \alpha(t), t \geq 0} |u| \leq K_0 \quad (3.1)$$

с постоянной K_0 , зависящей лишь от функций $f(x, t)$, $u_0(x)$ и $u_1(x)$ и от $\bar{\alpha}_0$.

Теорема 3.1. Пусть выполняются следующие условия.

- I. $\alpha(t) \in C^1([0, +\infty))$, $\alpha'(t) \geq 0$, $1 \leq \alpha(t) \leq \bar{\alpha}_0 < +\infty \forall t \geq 0$.
- II. $\beta(\xi, \eta) = \beta_0(\xi)\eta + \beta_1(\xi, \eta)$, $\beta_0(\xi) \in C(R)$, $\beta_1(\xi, \eta) \in C(\mathbb{R}^2)$, $\beta(\xi) \geq \bar{\beta}_0 > 0$, $\eta\beta_1(\xi, \eta) \geq 0$, $|\beta_1(\xi, \eta)|^m \leq M_0\eta\beta_1(\xi, \eta)$, $M_0 \geq 0$, $1 < m \leq 2$, $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$, $|\xi| \leq K_0$.
- III. $u_0(x) \in W_2^1(D_0)$, $u_1(x) \in L_2(D_0)$.

Кроме того, пусть для положительных чисел γ и k выполняются неравенства

$$\min \left\{ \gamma, \bar{\alpha}_0^2 \gamma, \gamma \frac{K_0^{2-m} M_0}{m} \left[\frac{2(m-1)\bar{\alpha}_0^2}{m} \right]^{m-1} \right\} < 1,$$

$$\bar{\beta}_0 - \gamma - \frac{k}{2} - \frac{\gamma k}{2} - \gamma K_1^2 \bar{\alpha}_0^2 > 0, \quad \frac{\gamma}{2} - k - \gamma k \bar{\alpha}_0^2 > 0,$$

где $K_1 = \max_{|\xi| \leq K_0} \beta_0(\xi)$.

Тогда для любой непрерывно дифференцируемой при $t \geq 0$ функции $\varphi(t)$ такой, что $\varphi(0) = 1$, $0 \leq \varphi'(t) \leq k\varphi(t)$ при $t \geq 0$, и для любой функции $f(x, t)$ такой, что

$$\int_0^\infty \varphi(\tau) \left(\int_0^{\alpha(\tau)} f^2(x, \tau) dx \right) d\tau < +\infty,$$

регулярное решение $u(x, t)$ краевой задачи I будет удовлетворять неравенству

$$\int_0^{\alpha(t)} [u_t^2(x, t) + u_x^2(x, t)] dx \leq \frac{M}{\varphi(t)}$$

с постоянной M , зависящей лишь от функций $f(x, t)$, $u_0(x)$ и $u_1(x)$ и от чисел $\bar{\alpha}_0$, $\bar{\beta}_0$ и M_0 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим равенство

$$\int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} Lu\varphi(\tau)(u_\tau + \gamma u) dx d\tau = \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} f\varphi(\tau)(u_\tau + \gamma u) dx d\tau.$$

Интегрируя по частям и используя неравенство

$$u^2(x, t) \leq \alpha(t) \int_0^{\alpha(t)} u_x^2(x, t) dx, \tag{3.2}$$

условия теоремы, оценку (3.1) и неравенство Юнга, нетрудно получить неравенство

$$\begin{aligned} & \frac{\varphi(t)}{2}(1-\gamma) \int_0^{\alpha(t)} u_t^2(x, t) dx + \frac{\varphi(t)}{2}(1-\bar{\alpha}_0^2\gamma) \int_0^{\alpha(t)} u_x^2(x, t) dx \\ & + \left(\bar{\beta}_0 - \gamma - \frac{k}{2} - \frac{\gamma k}{2} - \gamma K_1^2 \bar{\alpha}_0^2 - \frac{\delta_0^2}{2} \right) \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi(\tau) u_\tau^2 dx d\tau \\ & + \left(\frac{\gamma}{4} - \frac{k}{2} - \frac{\gamma k \bar{\alpha}_0^2}{2} - \frac{\gamma \bar{\alpha}_0^2 \delta_1^2}{2} \right) \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi(\tau) u_x^2 dx d\tau \\ & + \left(1 - \frac{\gamma K_0^{2-m} M_0}{m} \left[\frac{2(m-1)\bar{\alpha}_0^2}{m} \right]^{m-1} \right) \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi(\tau) u_\tau \beta_1(u, u_\tau) dx d\tau \end{aligned}$$

$$\leq \left(\frac{1}{2\delta_0^2} + \frac{1}{2\delta_1^2} \right) \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi(\tau) f^2 dx d\tau + \frac{1}{2} \int_0^t u_1^2(x) dx + \frac{1}{2} \int_0^1 u_{0x}^2(x) dx + \left| \int_0^1 u_0(x) u_1(x) dx \right|.$$

Подбирая теперь числа δ_0 и δ_1 малыми и фиксируя их, из последнего неравенства получаем требуемую оценку. Теорема доказана.

В качестве функции $\varphi(t)$ можно взять, например, функции $\exp(kt)$, $(1+t)^k$, $k > 0$. Легко проверить, что всегда можно подобрать малое число γ так, чтобы требуемые в теореме неравенства, связывающие числа γ и k , выполнялись.

Приведем еще один результат о столь же «хорошем» поведении энергетической нормы решения при $t \rightarrow \infty$.

Теорема 3.2. Пусть следующие выполняются условия.

I. $\alpha(t) \in C^1([0, +\infty))$, $\alpha'(t) \geq 0$, $t \geq 0$.

II. $\beta(\xi, \eta) = \beta_0(\xi, \eta) + \beta_1(\xi)$, $\beta_0(\xi, \eta) \in C(\mathbb{R}^2)$, $\beta_1(\xi) \in C(R)$,

$$\eta\beta_0(\xi, \eta) \geq \bar{\beta}_0 \cdot [\eta^2 + (1 + |\xi|^l)|\eta|^{p+2}], \quad \bar{\beta}_0 > 0, \quad p \geq 0, \quad l \geq 0,$$

$$|\beta_0(\xi, \eta)| \leq M_0[|\eta| + (1 + |\xi|^l)|\eta|^{p+1}], \quad M_0 \geq 0,$$

$$\xi\beta_1(\xi) \geq \bar{\beta}_1 \cdot [\xi^2 + |\xi|^{p+2} + |\xi|^{p+l+2}], \quad \bar{\beta}_1 > 0,$$

$$\int_0^\xi \beta_1(\theta) d\theta \leq M_1 \xi \beta_1(\xi), \quad M_1 \geq 0.$$

III. $u_0(x) \in W_2^1(D_0)$, $u_1(x) \in L_2(D_0)$.

Кроме того, пусть для положительных чисел γ и k выполняются неравенства

$$\max\left(\frac{k}{2}, 2kM_1\right) < \gamma < \min(1, \bar{\beta}_1), \quad \bar{\beta}_0 - \frac{k}{2} - \gamma - \frac{\gamma k}{2} - \frac{\gamma M_0^2}{\bar{\beta}_1} > 0, \quad \bar{\beta}_1 > 2k,$$

$$(p+2) \left[\frac{\bar{\beta}_1(p+2)}{4M_0} \right]^{\frac{1}{p+1}} \bar{\beta}_0 - \gamma(p+1)M_0 > 0.$$

Тогда для любой непрерывно дифференцируемой при $t \geq 0$ функции $\varphi(t)$ такой, что $\varphi(0) = 1$, $0 \leq \varphi'(t) \leq k\varphi(t)$ при $t \geq 0$, и для любой функции $f(x, t)$ такой, что

$$\int_0^\infty \varphi(\tau) \left(\int_0^{\alpha(\tau)} f^2(x, \tau) dx \right) d\tau < +\infty,$$

регулярное решение $u(x, t)$ краевой задачи I или регулярное решение $u(x, t)$ краевой задачи III будет удовлетворять неравенству

$$\int_0^{\alpha(t)} [|u(x, t)|^2 + |u(x, t)|^{p+2} + |u(x, t)|^{p+l+2} + u_t^2(x, t) + u_x^2(x, t)] dx \leq \frac{M}{\varphi(t)}$$

с постоянной M , зависящей лишь от функций $f(x, t)$, $u_0(x)$ и $u_1(x)$ и от чисел $\bar{\beta}_0$, $\bar{\beta}_1$, M_0 и M_1 .

Доказательство теоремы 3.2 проводится по той же схеме, что и доказательство теоремы 3.1.

Как и ранее, в качестве функции $\varphi(t)$ можно взять функции $\exp(kt)$, $(1+t)^k$, $k > 0$.

«Хорошее» убывание энергетической нормы решения (в частности, экспоненциальное) в случае сильно расширяющихся областей Q_∞ обеспечивается во многом наличием не тождественно нулевой функции $\beta_1(\xi)$ (подобный факт имеет место даже для линейного уравнения (1.1) — см., например, работу [16] и библиографию в ней). Если же функция $\beta_1(\xi)$ отсутствует, то для расширяющихся неограниченно по переменной x областей Q_∞ нам удалось доказать убывание энергетической нормы решения (вообще говоря, более медленное, чем в теоремах 3.1 и 3.2) лишь в некотором специальном случае.

Прежде чем формулировать теорему, заметим, что для регулярных решений краевой задачи I или краевой задачи III при выполнении условий теорем существования всегда имеет место оценка

$$\int_0^{\alpha(t)} u_x^2(x, t) dx \leq K_0 \tag{3.3}$$

с постоянной K_0 , зависящей лишь от функций $f(x, t)$, $u_0(x)$ и $u_1(x)$.

Теорема 3.3. Пусть выполняются следующие условия.

- I. $\alpha(t) \in C^1([0, +\infty))$, $\alpha'(t) \geq 0$, $t \geq 0$.
- II. $\beta(\xi, \eta) = \beta_0(\xi)\eta$, $\beta_0(\xi) \in C(R)$, $\beta_0(\xi) \geq \bar{\beta}_0 > 0$,

$$\int_0^\xi \theta \beta_0(\theta) d\theta \leq \bar{\beta}_1(|\xi|^2 + |\xi|^{q+2}), \quad \bar{\beta}_1 > 0, \quad q \geq 0, \quad \xi \in \mathbb{R};$$

- III. $u_0(x) \in W_2^1(D_0)$, $u_1(x) \in L_2(D_0)$.

Кроме того, пусть для положительных чисел γ и k выполняются неравенства

$$\bar{\beta}_0 > \frac{3}{2}\gamma + \frac{\gamma^2}{2}, \quad \gamma > k.$$

Тогда для любой непрерывно дифференцируемой при $t \geq 0$ функции $\varphi(t)$ такой, что $\varphi(0) = 1$, $0 \leq \varphi'(t) \leq k\varphi(t)$, $(2\bar{\beta}_1 + 2\bar{\beta}_1 K_0^{q/2} + 1)\varphi'(t)\alpha^{\frac{q+4}{2}}(t) \leq \varphi(t)$, и для любой функции $f(x, t)$ такой, что

$$\int_0^\infty \varphi(\tau)\alpha^2(\tau) \left(\int_0^{\alpha(\tau)} f^2(x, \tau) dx \right) d\tau < +\infty,$$

регулярное решение $u(x, t)$ краевой задачи I или регулярное решение $u(x, t)$ краевой задачи III будет удовлетворять неравенству

$$\int_0^{\alpha(\tau)} [u^2(x, t) + u_t^2(x, t) + u_x^2(x, t)] dx \leq \frac{M}{\varphi(t)}$$

с постоянной M , зависящей лишь от функций $f(x, t)$, $u_0(x)$ и $u_1(x)$ и от чисел $\bar{\beta}_0$ и $\bar{\beta}_1$.

Доказательство. Как и ранее, проанализируем равенство

$$\int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi(\tau) Lu(u_\tau + \gamma u) dx d\tau = \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi(\tau) f(u_\tau + \gamma u) dx d\tau. \tag{3.4}$$

Какие-либо пояснения в этом анализе требуются, на наш взгляд, лишь при оценке интегралов

$$I_1 = \gamma \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi'(t) \left(\int_0^{u(x,\tau)} \xi \beta_0(\xi) d\xi \right) dx d\tau, \quad I_2 = \gamma \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi f u dx d\tau.$$

Интеграл I_1 оценивается с помощью условий I, II и неравенств (3.2), (3.3) следующим образом:

$$\begin{aligned} I_1 &\leq \gamma \bar{\beta}_1 \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi'(\tau) u^2 dx d\tau + \gamma \bar{\beta}_1 \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi'(\tau) |u|^{q+2} dx d\tau \\ &\leq \gamma \bar{\beta}_1 \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi'(\tau) \alpha^2(\tau) \int_0^{\alpha(\tau)} u_x^2 dx d\tau + \gamma \bar{\beta}_1 \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi'(\tau) \alpha^{\frac{q+4}{2}}(\tau) \left(\int_0^{\alpha(\tau)} u_x^2 dx \right)^{\frac{q+2}{2}} d\tau \\ &\leq \gamma \bar{\beta}_1 (1 + K_0^{q/2}) \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi'(\tau) \alpha^{\frac{q+4}{2}}(\tau) \left(\int_0^{\alpha(\tau)} u_x^2 dx \right) d\tau. \end{aligned}$$

Прежде чем оценивать интеграл I_2 , преобразуем его. Определим функцию

$$g(x, \tau) = \int_0^x f(x, \tau) dz.$$

Имеет место равенство

$$I_2 = - \int_0^t \int_0^{\alpha(\tau)} \varphi g u_x dx d\tau.$$

Теперь при оценке I_2 мы вполне можем воспользоваться неравенством Юнга.

В остальном анализ равенства (3.4) стандартен. Условия теоремы, свойства функций $\varphi(t)$ и $f(x, t)$ приводят к нужному неравенству. Теорема доказана.

Если функция $\alpha(t)$ имеет вид $\alpha(t) = (1+t)^\lambda$ с достаточно малым положительным показателем λ , то в качестве функции $\varphi(t)$ можно взять функцию $\exp[(1+t)^k]$ также с достаточно малым положительным показателем k .

Заключение

Завершая работу, сделаем несколько замечаний.

1. Исследование уравнения (1.1) в областях Q_T с двумя криволинейными границами, т. е. в областях вида $\{(x, t) : 0 < t < T, \alpha_1(t) < x < \alpha_2(t)\}$, можно провести методами, в целом аналогичными изложенным выше. В частности, переход к цилиндрической области осуществляется с помощью замены

$$z = \frac{x - \alpha_1(t)}{\alpha_2(t) - \alpha_1(t)}.$$

2. Строго говоря, для функций $\beta(\xi, \eta)$ вида, указанного в теореме 3.2, мы не доказывали теорем существования регулярных решений той или иной краевой задачи. Однако уже из первой априорной оценки, если она имеет место, следует ограниченность решения $u(x, t)$ в любой области Q_T конечной высоты, и

тогда слагаемое $\beta_1(u)$ становится подчиненным. Другими словами, все теоремы § 1, 2 останутся справедливыми, если младшие члены в уравнении (1.1) имеют вид $\beta_0(u, u_t) + \beta_1(u)$, причем для функции $\beta_0(\xi, \eta)$ выполняются все условия, налагаемые ранее на функцию $\beta(\xi, \eta)$ (в той или иной теореме), для функции же $\beta_1(\xi)$ выполняется условие $\xi\beta_1(\xi) \geq 0$.

3. Пусть функция $\alpha'(t)$ кусочно-непрерывна, и пусть на участках ее непрерывности выполняется одно из условий $0 \leq \alpha'(t) \leq \alpha_0 < 1$, $0 \geq \alpha'(t) \geq -\alpha_0 > -1$, $\alpha'(t) \geq \alpha_0 > 1$. Кроме того, пусть таких участков конечное число. Нетрудно понять, что в области Q_T с подобной криволинейной границей корректной для уравнения (1.1) будет краевая задача с заданием на соответствующих участках условий краевой задачи I, II или III.

ЛИТЕРАТУРА

1. Lions J.-L. Une remarque sur les problemes d'evolution nonlineaires dans les domaines non cylindriques // *Rov. Romaine Pures Appl. Math.* 1964. V. 9. P. 11–18.
2. Lions J.-L. Quelques methodes de resolution des problemes aux limites non liniaires. Paris: Dunod, 1969.
3. Medeiros L. A. Non-linear wave equations in domains with variable boundary // *Arch. Rational Mech. Anal.* 1972. V. 47, N 1. P. 47–58.
4. Cooper J., Medeiros L. A. The Cauchy problem for nonlinear wave equations in the domain with moving boundary // *Ann. Scuola Normale Sup. Pisa Cl. Sci.*, (4). 1972. V. 26. P. 829–838.
5. Cooper J., Bardos C. A nonlinear wave equation in a time dependent domain // *J. Math. Anal. Appl.* 1973. V. 42, N 1. P. 29–60.
6. Inoue A. Sur $\square u + u^3 = f$ dans us domaine non cilindrique // *J. Math. Anal. Appl.* 1974. V. 46, N 3. P. 777–819.
7. Sidelnik Y. I. Existense and uniqueness of a generalized solution of the mixed problem for an equation of plate oscillation type in a noncylindrical domains // *J. of Soviet Math.* 1993. V. 63, N 1. P. 98–101.
8. Ferreira J. Nonlinear hyperbolic-parabolic partial differential equations in noncylindrical domains // *Rend. Circ. Mat. Palermo* (2). 1995. V. 44. P. 135–146.
9. Ferreira J., Lar'kin N. A. Global solvability of a mixed problem for a nonlinear hyperbolic-parabolic equation in noncylindrical domains // *Portugal. Math.* 1996. V. 53, N 4. P. 381–395.
10. Limaco Ferrel J., Mederos L. A. Kirchoff — Carrier elastic strings in noncylindrical domains // *Portugal. Math.* 1999. N 4. P. 465–500.
11. Nakao M., Narazaki T. Existence and decay of solutions of some nonlinear wave equations in noncylindrical domains // *Math. Rep.* 1978. V. 11, N 2. P. 117–125.
12. Ferreira J., Lar'kin N. A. Decay of solutions of nonlinear hyperbolic-parabolic equations in noncylindrical domains // *Comm. Appl. Anal.* 1997. V. 1, N 1. P. 75–81.
13. Cousin A. T., Frota C. L., Lar'kin N. A. Regular solutions and energy decay for the equation of viscoelasticity with nonlinear damping on the boundary // *J. Math. Anal. Appl.* 1998. N 2. P. 273–296.
14. Cousin A. T., Lar'kin N. A. On the nonlinear initial boundary value problem for the equation of viscoelasticity // *Nonlinear Anal., Theory, Methods and Appl.* 1998. V. 31, N 1–2. P. 229–242.
15. Хартман Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Мир, 1970.
16. Hirose F. Energy decay for a degenerate hyperbolic equation with a dissipative term // *Publ. Res. Inst. Math. Sci.* 1999. V. 35, N 3. P. 391–406.

Статья поступила 13 марта 2000 г.

*Кожанов Александр Иванович
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск 630090
kozhanov@math.nsc.ru*

*Ларькин Николай Андреевич
Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, Новосибирск 630090
nlarkine@uem.br*