

УДК 517.95

К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ТРИКОМИ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ СМЕШАННОГО ТИПА

К. Б. Сабитов, М. Ф. Мугафаров

Аннотация: Установлены экстремальные свойства регулярных и обобщенных решений задачи Трикоми для системы уравнений смешанного типа

$$L_i U \equiv K(y)u_{ixx} + u_{iy y} + A_i(x, y)u_{ix} + B_i(x, y)u_{iy} + \sum_{k=1}^n C_{ik}(x, y)u_k = F_i(x, y), \quad (1)$$

где $yK(y) > 0$ при $y \neq 0$, $i = \overline{1, n}$, $n \geq 2$, $U = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ при некоторых ограничениях на ее коэффициенты. На основании этих свойств альтернирующим методом типа Шварца доказана однозначная обобщенная разрешимость задачи Трикоми для системы (1), когда $K(y) = \operatorname{sgn} y \cdot |y|^m$, $m = \operatorname{const} \geq 0$, $F_i(x, y) \equiv 0$, при произвольном подходе эллиптической границы области к оси $y = 0$, за исключением случаев касания и осцилляции. Ил. 1, библиогр. 24.

§ 1. Постановка задачи. Основные результаты

Рассмотрим систему

$$L_i U \equiv K(y)u_{ixx} + u_{iy y} + A_i(x, y)u_{ix} + B_i(x, y)u_{iy} + \sum_{k=1}^n C_{ik}(x, y)u_k = F_i(x, y), \quad (1)$$

где $yK(y) > 0$ при $y \neq 0$, $i = \overline{1, n}$, $n \geq 2$, $U = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, в области $D \subset R^2$, ограниченной простой кривой Жордана Γ , лежащей в полуплоскости $y > 0$ с концами в точках $A(0, 0)$ и $B(l, 0)$, $l = \operatorname{const} > 0$, и характеристиками AC и CB системы (1) при $y < 0$. Части области D , в которых $y > 0$ и $y < 0$, обозначим соответственно через D_+ и D_- .

В области D для системы (1) поставим аналог задачи Трикоми.

Задача Т. Найти функцию $U(x, y)$, удовлетворяющую условиям

$$U(x, y) \in C(\overline{D}) \wedge C^1(D) \wedge C^2(D_+ \cup D_-); \quad (2)$$

$$L_i U(x, y) \equiv F_i(x, y), \quad (x, y) \in D_+ \cup D_-, \quad i = \overline{1, n}; \quad (3)$$

$$U(x, y) = \Phi(x, y), \quad (x, y) \in \Gamma; \quad (4)$$

$$U(x, y)|_{AC} = \Psi(x), \quad 0 \leq x \leq l/2, \quad (5)$$

где $\Phi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ и $\Psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n)$ — заданные достаточно гладкие вектор-функции, $\varphi_i(0, 0) = \psi_i(0)$.

Краевые задачи для систем уравнений смешанного типа изучены в работах [1–10]. В них теоремы единственности и существования в определенном

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 99–01–00934).

© 2002 Сабитов К. Б., Мугафаров М. Ф.

смысле решения задачи Т доказаны в предположении, что кривая Γ в точках A и B оканчивается ортогонально к оси Ox или сколь угодно малыми дугами «нормальной» кривой системы (1) и при достаточно жестких ограничениях на коэффициенты системы. В работе [5] установлен принцип максимума модуля

$$|U(x, y)| = \sqrt{\sum_{i=1}^n u_i^2(x, y)}$$

решения задачи Т для системы (1) при $K(y) = y$,

$A_i(x, y) = B_i(x, y) \equiv 0, (C_{ik}(x, y)), i, k = \overline{1, n}, n \geq 2$, — отрицательно определенная матрица, компоненты которой в области D_+ удовлетворяют условиям

$$(n - 1)(C_{ik}(x, y) + C_{ki}(x, y)) \leq 2(C_{ii}(x, y)C_{kk}(x, y))^{1/2}, \quad i \neq k, \quad (*)$$

а в области D_- достаточно малы, из которого следует единственность решения задачи Т. Если граничные функции достаточно гладкие и кривая Γ в точках A и B оканчивается ортогонально к оси Ox или сколь угодно малыми дугами «нормальной» кривой системы (1), на основе теоремы единственности методом интегральных уравнений получена теорема существования решения задачи Т. В работе [8] результаты из [5] перенесены для системы уравнений смешанного типа с двумя перпендикулярными линиями изменения типа. В работах [3, 4, 6] при некоторых геометрических ограничениях на кривую Γ при условии, что матрицы A, B и C достаточно малы, доказана однозначная разрешимость задачи Т в пространстве $W_2^1(D)$. В работах [1, 2, 6, 9] задача Трикоми исследована для систем уравнений смешанного типа первого порядка.

Считая максимумом решения $U(x, y)$ системы (1) число $\max_i \max_{\overline{D}} u_i(x, y)$ (см. [11]), в данной работе установим экстремальные свойства решений задачи Т в областях эллиптичности, гиперболичности и в целом в смешанной области D в классе регулярных и обобщенных решений системы (1). Под обобщенным в области D решением системы (1) понимается предел последовательности регулярных в D решений системы (1), равномерно сходящейся к нему в замкнутой области \overline{D} . На основании этих свойств получены теоремы единственности и существования обобщенного решения задачи Т при произвольном подходе кривой Γ к оси Ox , за исключением случаев касания и осцилляции, без ограничений (*) и малости коэффициентов системы (1). Для доказательства существования обобщенного решения задачи Т построен альтернирующий процесс типа Шварца.

§ 2. Экстремальные свойства решений системы в области эллиптичности

Лемма 1. Пусть 1) функция $U(x, y)$ принадлежит $C(\overline{D}_+) \wedge C^2(D_+)$ и $L_i U \equiv F_i$, в D_+ при всех $i = \overline{1, n}$;

2) коэффициенты системы (1) в области D_+ ограничены, и

$$C_{ik}(x, y) \geq 0 \text{ при } k \neq i, \quad C_{ii}(x, y) + \sum_{k \neq i}^n C_{ik}(x, y) < 0, \quad F_i \geq 0 (\leq 0), \quad (6)$$

или

$$C_{ik}(x, y) \geq 0 \text{ при } k \neq i, \quad C_{ii}(x, y) + \sum_{k \neq i}^n C_{ik}(x, y) \leq 0, \quad F_i > 0 (< 0). \quad (7)$$

Тогда если $\max_i \max_{\overline{D}_+} u_i(x, y) > 0$ ($\min_i \min_{\overline{D}_+} u_i(x, y) < 0$), то этот максимум (минимум) достигается только на границе области D_+ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\max_i \max_{\bar{D}_+} u_i(x, y) = u_j(Q) > 0$. Допустим, что $Q \in D_+$. Тогда в точке Q

$$u_{jx} = u_{jy} = 0, \quad u_{jxx} \leq 0, \quad u_{jyy} \leq 0 \quad (8)$$

и в силу условий (6) и (8)

$$\begin{aligned} L_j[U(Q)] &= Ku_{jxx}(Q) + u_{jyy}(Q) + \sum_{k=1}^n C_{jk}u_k(Q) \\ &= Ku_{jxx}(Q) + u_{jyy}(Q) + \sum_{k \neq j}^n C_{jk}[u_k(Q) - u_j(Q)] + u_j(Q) \left(C_{jj} + \sum_{k \neq j}^n C_{jk} \right) < 0. \end{aligned}$$

С другой стороны, $L_j[U(Q)] = F_j(Q) \geq 0$. Полученное противоречие доказывает справедливость принципа максимума с условиями (6). Аналогично показывается справедливость принципа максимума при выполнении условий (7).

Лемма 2. Пусть 1) функция $U(x, y)$ принадлежит $C(\bar{D}_+) \wedge C^2(D_+)$ и $L_i U \equiv 0$, в D_+ при всех $i = \overline{1, n}$;

2) коэффициенты системы (1) в области D_+ ограничены, и

$$C_{ii}(x, y) + \sum_{k \neq i}^n |C_{ik}(x, y)| < 0. \quad (9)$$

Тогда если $\max_i \max_{\bar{D}_+} |u_i(x, y)| > 0$, то этот максимум достигается только на границе области D_+ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\max_i \max_{\bar{D}_+} |u_i(x, y)| = |u_j(Q)| > 0$. Допустим, что $Q \in D_+$. Пусть $u_j(Q) > 0$. Тогда в силу условий (8) и (9)

$$\begin{aligned} L_j[U(Q)] &\leq Ku_{jxx}(Q) + u_{jyy}(Q) + C_{jj}u_j(Q) + \sum_{k \neq j}^n |C_{jk}||u_k(Q)| \\ &\leq Ku_{jxx}(Q) + u_{jyy}(Q) + u_j(Q) \left(C_{jj} + \sum_{k \neq j}^n |C_{jk}| \right) < 0. \end{aligned}$$

С другой стороны, $L_j[U(Q)] = 0$. Если $u_j(Q) < 0$, то

$$\begin{aligned} L_j[U(Q)] &\geq Ku_{jxx}(Q) + u_{jyy}(Q) + C_{jj}u_j(Q) - \sum_{k \neq j}^n |C_{jk}||u_k(Q)| \\ &\geq Ku_{jxx}(Q) + u_{jyy}(Q) + u_j(Q) \left(C_{jj} + \sum_{k \neq j}^n |C_{jk}| \right) > 0, \end{aligned}$$

что противоречит $L_j[U(Q)] = 0$.

Лемма 3. Пусть 1) $U(x, y) \in C(\bar{D}_+) \wedge C^2(D_+)$ и $L_i U \equiv F_i$, в D_+ при всех $i = \overline{1, n}$;

2) коэффициенты системы (1) в области D_+ ограничены, и

$$C_{ik}(x, y) \geq 0, \quad \text{при } k \neq i, \quad C_{ii}(x, y) + \sum_{k \neq i}^n C_{ik}(x, y) \leq 0, \quad F_i \geq 0 \quad (\leq 0), \quad (10)$$

при этом функции $u_i(x, y)$ не равны постоянной в любой подобласти области D_+ .

Тогда если $\max_i \max_{\overline{D_+}} u_i(x) = u_j(Q) > 0$, $(\min_i \min_{\overline{D_+}} u_i(x) = u_j(Q) < 0)$, то этот максимум (минимум) достигается только на границе области D_+ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Введем вспомогательную функцию $W(x, y) = (w_1, w_2, \dots, w_n)$, где $w_i(x, y) = u_i(x, y) - u_j(Q)$, которая в области D_+ является решением системы

$$L_i(W) = F_i - u_j(Q) \sum_{k=1}^n C_{ik}(x, y),$$

и $w_i(x, y) \leq 0$ в $\overline{D_+}$, $\max_i \max_{\overline{D_+}} w_i(x, y) = w_j(Q) = 0$. Тогда функция $w_j(x, y)$ в D_+ является решением эллиптического уравнения

$$M_j(w_j) \equiv Kw_{jxx} + w_{jyy} + A_jw_{jx} + B_jw_{jy} + C_{jj}w_j = g_j, \quad (11)$$

где

$$g_j = F_j - u_j(Q) \sum_{k=1}^n C_{jk} - \sum_{k \neq j}^n C_{jk}w_k.$$

В силу условий (10) правая часть уравнения (11) неотрицательна в области D_+ . Пусть $Q \in D_+$. Поскольку оператор M_j локально равномерно эллиптивен при $y \geq \delta > 0$, где δ — достаточно малое число, и его коэффициенты ограничены в D_+ , то в силу теоремы Хопфа [12] $w_j(x, y) \equiv 0$, что невозможно. Значит, $Q \in \partial D_+$.

Лемма 4. Пусть 1) $U(x, y) \in C(\overline{D_+}) \wedge C^2(D_+)$ и $L_iU \equiv 0$ в D_+ при всех $i = \overline{1, n}$;

2) коэффициенты системы (1) в области D_+ ограничены, и

$$C_{ii}(x, y) + \sum_{k \neq i}^n |C_{ik}(x, y)| \leq 0, \quad (12)$$

при этом функции $u_i(x, y)$ не равны постоянной в любой подобласти области D_+ .

Тогда $\max_i \max_{\overline{D_+}} |u_i(x, y)| > 0$ достигается только на границе области D_+ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\max_i \max_{\overline{D_+}} |u_i(x, y)| = |u_j(Q)| > 0$. Не теряя общности, будем считать, что $u_j(Q) > 0$. Тогда $\max_i \max_{\overline{D_+}} u_i(x, y) = u_j(Q)$ и $|u_i(x, y)| \leq u_j(Q)$ в $\overline{D_+}$. Рассуждая, как при доказательстве леммы 3, введем новую функцию $W(x, y)$. При этом функция $w_j(x, y) = u_j(x, y) - u_j(Q)$ является решением эллиптического уравнения (11), правая часть которого в силу условия (12) в области D_+ неотрицательна. В самом деле,

$$g_j = -u_j(Q)C_{jj} - \sum_{k \neq j} C_{jk}[u_j(Q) + w_k] \geq -u_j(Q) \left(C_{jj} + \sum_{k \neq j} |C_{jk}| \right) \geq 0.$$

Если теперь $Q \in D_+$, то в силу теоремы Хопфа [12] имеем $w_j(x, y) \equiv 0$ в D_+ , что невозможно.

ЗАМЕЧАНИЕ 1. В леммах 1–4 условия на коэффициенты системы (1) существенны.

В качестве примера рассмотрим в области $D \subset \mathbb{R}^2$, содержащей в себе начало координат, систему

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u_1}{\partial y^2} + 4\alpha u_1 - 4\alpha^2(x^2 + y^2)u_2 &= 0, \\ \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u_2}{\partial y^2} - 4\alpha^2(x^2 + y^2)u_1 + 4\alpha u_2 &= 0, \end{aligned}$$

где $\alpha = \text{const} > 0$, для которой

$$C_{ii} + \sum_{k \neq i}^n |C_{ik}| = 4\alpha + 4\alpha^2(x^2 + y^2) > 0.$$

Она имеет решение $u_1 = u_2 = \exp[-\alpha(x^2 + y^2)]$. Функции u_1 и u_2 достигают своего положительного глобального максимума внутри области D .

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Если в лемме 3 $\sum_{k=1}^n C_{ik}(x, y) \equiv 0$ в области D_+ при любом i , то нет необходимости в условии $\max_i \max_{\overline{D_+}} u_i(x, y) > 0$ ($\max_i \max_{\overline{D_+}} u_i(x, y) < 0$).

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Экстремальные свойства модуля решений эллиптических и параболических систем изучались в работах [13–18].

Лемма 5. Пусть 1) $U(x, y) \in C(\overline{D_+}) \wedge C^1(D_+ \cup AB) \wedge C^2(D_+)$, $L_i U \equiv F_i$ в D_+ при $i = \overline{1, n}$;

2) в области D_+ коэффициенты системы (1) ограничены и удовлетворяют условию (10);

3) $\max_i \max_{\overline{D_+}} u_i(x, y) = u_j(x_0, 0) > 0$ ($\min_i \min_{\overline{D_+}} u_i = u_j(x_0, 0) < 0$), $0 < x_0 < l$.

Тогда

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} u_{jy}(x_0, y) < 0. \quad (13)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\max_i \max_{\overline{D_+}} u_i(x, y) = u_j(Q) > 0$. Рассуждая аналогично доказательству леммы 3, введем новую функцию $W(x, y)$. При этом функция $w_j(x, y)$ является решением эллиптического уравнения (11), правая часть которого в силу условия (10) в области D_+ неотрицательна. Тогда коэффициенты уравнения (11) и функция $w_j(x, y)$ удовлетворяют условиям леммы 1 [19]. Поэтому

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} w_{jy}(x_0, y) < 0.$$

Отсюда уже следует неравенство (13).

Лемма 6. Пусть 1) $U(x, y) \in C(\overline{D_+}) \wedge C^1(D_+ \cup AB) \wedge C^2(D_+)$, $L_i U \equiv 0$ в D_+ ;

2) в области D_+ коэффициенты системы (1) ограничены и удовлетворяют условию (12);

3) $\max_i \max_{\overline{D_+}} |u_i(x, y)| = |u_j(x_0, 0)| > 0$, $0 < x_0 < l$.

Тогда

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\partial}{\partial y} |u_j(x_0, y)| < 0. \quad (14)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\max_i \max_{\overline{D_+}} |u_i(x, y)| = |u_j(Q)| > 0$. В силу условий леммы можно считать $u_j(Q) > 0$. Тогда $\max_i \max_{\overline{D_+}} u_i(x, y) = u_j(Q)$ и $|u_i(x, y)| \leq$

$u_j(Q)$ в области D_+ . Как и при доказательстве леммы 3, введем функцию $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$, где $w_i = u_i(x, y) - u_j(Q)$. При этом функция $w_j(x, y)$ является решением эллиптического уравнения (11) и $w_j(x, y) \leq 0$ в \overline{D}_+ , $\max_{\overline{D}_+} w_j(x, y) = w_j(Q) = 0$. Ввиду условия (12) правая часть уравнения (11) неотрицательна в D_+ . Тогда коэффициенты уравнения (11) и функция $w_j(x, y)$ удовлетворяют условиям леммы 1 из [19], согласно которой

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} w_{jy}(x_0, y) < 0.$$

Из последнего неравенства следует (14).

§ 3. Экстремальные свойства решений системы в области гиперболичности

В области D_- перейдем к характеристическим координатам

$$\xi = x + \int_0^y \sqrt{-K(t)} dt, \quad \eta = x - \int_0^y \sqrt{-K(t)} dt,$$

где $K(y) \in C[y_c, 0] \wedge C^1[y_c, 0)$, y_c — ордината точки C . В этих координатах система (1) имеет вид

$$\tilde{L}_i U(\xi, \eta) \equiv u_{i\xi\eta} + a_i(\xi, \eta)u_{i\xi} + b_i(\xi, \eta)u_{i\eta} + \sum_{k=1}^n c_{ik}(\xi, \eta)u_k = f_i(\xi, \eta), \quad (15)$$

где

$$a_i(\xi, \eta) = (A_i + B_i\sqrt{-K} - K'/2\sqrt{-K})/4K,$$

$$b_i(\xi, \eta) = (A_i - B_i\sqrt{-K} + K'/2\sqrt{-K})/4K,$$

$$c_{ik}(\xi, \eta) = C_{ik}/4K, \quad f_i(\xi, \eta) = F_i/4K,$$

а область D_- отображается в $\Delta = \{(\xi, \eta) : 0 < \xi < \eta < l\}$. Обозначим через $A_0 = (0, 0)$, $B_0 = (l, l)$, $C_0 = (0, l)$ вершины треугольника Δ ; $\alpha_i = a_i\beta_i$, $\beta_i = \exp \int b_i d\xi$, $h_i = a_i\xi + a_i b_i - c_{ii}$.

Будем предполагать, что коэффициенты $a_{i\xi}$, b_i , c_{ik} непрерывны в $\overline{\Delta}$, кроме, может быть, отрезка $\overline{A_0 B_0}$, где они могут обращаться в бесконечность, и удовлетворяют одному из условий

$$\begin{cases} h_i(\xi, \eta) \geq 0, \quad c_{ik}(\xi, \eta) \leq 0 \text{ при } i \neq k, \\ \alpha_i(0, \eta) + \int_0^\xi \beta_i(t, \eta) \sum_{k=1}^n c_{ik}(t, \eta) dt > 0, \quad 0 < \xi < \eta \leq l; \end{cases} \quad (16)$$

$$\alpha_i(\xi, \eta) - \int_0^\xi \beta_i(t, \eta) \left(|h_i(t, \eta)| + \sum_{k \neq i} |c_{ik}(t, \eta)| \right) dt > 0, \quad 0 < \xi < \eta \leq l. \quad (17)$$

Предполагается, что функции $f_i(\xi, \eta)$ интегрируемы по ξ на каждом отрезке $[0, \xi_0]$ прямой $\eta = \eta_0$, $0 < \xi_0 < \eta_0 \leq l$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Под *регулярным решением системы* (15) в области Δ будем понимать функцию $U(\xi, \eta)$, удовлетворяющую условиям: $U(\xi, \eta) \in C(\overline{\Delta}) \wedge C^1(\Delta)$, $U_\eta \in C(\overline{\Delta} \setminus \overline{A_0 B_0})$, $U_{\xi\eta} \in C(\Delta)$, $\tilde{L}_i U(\xi, \eta) \equiv f_i(\xi, \eta)$ в Δ при $i = \overline{1, n}$.

Лемма 7. Пусть 1) коэффициенты системы (15) обладают отмеченной выше гладкостью и удовлетворяют условию (16);

2) $f_i(\xi, \eta) \geq 0$ (≤ 0) в Δ ;

3) $U(\xi, \eta)$ — регулярное в Δ решение системы (15), равное нулю на характеристике A_0C_0 .

Тогда если $\max_i \max_{\overline{\Delta}} u_i(\xi, \eta) > 0$ ($\min_i \min_{\overline{\Delta}} u_i(\xi, \eta) < 0$), то этот максимум (минимум) достигается только на отрезке $\overline{A_0B_0}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В области Δ рассмотрим тождество

$$\beta_i \tilde{L}_i(U) \equiv (\beta_i u_{i\eta} + \alpha_i u_i)_\xi - u_i \beta_i h_i + \beta_i \sum_{k \neq i}^n c_{ik} u_k$$

и проинтегрируем его по отрезку NM прямой $\eta = \text{const}$, принадлежащему Δ . Тогда получим

$$(\beta_i u_{i\eta} + \alpha_i u_i)|_N^M = \int_{NM} \beta_i f_i d\xi + \int_{NM} \left(\beta_i h_i u_i - \beta_i \sum_{k \neq i}^n c_{ik} u_k \right) d\xi. \quad (18)$$

Пусть $\max_i \max_{\overline{\Delta}} u_i(\xi, \eta) = u_j(Q) > 0$, $Q \in \overline{\Delta}$. Ясно, что $Q \notin \overline{A_0C_0}$. Пусть $Q \in \Delta \cup C_0B_0$. Из точки Q проведем отрезок $\eta = \text{const}$ до пересечения с характеристикой $\xi = 0$ в точке P . В равенстве (18) в качестве отрезка NM возьмем PQ и положим $i = j$. Тогда

$$\begin{aligned} \beta_j(Q) u_{j\eta}(Q) &= \int_{PQ} \beta_j f_j d\xi + \int_{PQ} \beta_j h_j [u_j - u_j(Q)] d\xi + u_j(Q) \int_{PQ} \beta_j h_j d\xi \\ &\quad - \int_{PQ} \beta_j \sum_{k \neq j}^n c_{jk} [u_k - u_j(Q)] d\xi - u_j(Q) \int_{PQ} \beta_j \sum_{k \neq j}^n c_{jk} d\xi - \alpha_j(Q) u_j(Q) \\ &= \int_{PQ} \beta_j f_j d\xi + \int_{PQ} \beta_j h_j [u_j - u_j(Q)] d\xi - \int_{PQ} \beta_j \sum_{k \neq j}^n c_{jk} [u_k - u_j(Q)] d\xi \\ &\quad - u_j(Q) \left[\alpha_j(P) + \int_{PQ} \beta_j \sum_{k=1}^n c_{jk} d\xi \right]. \end{aligned}$$

Отсюда в силу условий леммы $u_{j\eta}(Q) < 0$; противоречие с тем, что в точке Q максимума функции u_j в $\overline{\Delta}$ производная $u_{j\eta}(Q)$ неотрицательна. Тогда $Q \in \overline{A_0B_0}$.

Лемма 8. Пусть 1) коэффициенты системы (15) удовлетворяют условию (17);

2) $f_i(\xi, \eta) \equiv 0$;

3) $U(\xi, \eta)$ — решение системы (15), равное нулю на характеристике A_0C_0 .

Тогда если $\max_i \max_{\overline{\Delta}} |u_i(\xi, \eta)| > 0$, то этот максимум достигается на отрезке $\overline{A_0B_0}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\max_i \max_{\overline{\Delta}} |u_i(\xi, \eta)| = |u_j(Q)| > 0$. Не теряя общности, можно считать, что $u_j(Q) > 0$. Тогда $\max_i \max_{\overline{\Delta}} u_i(\xi, \eta) = u_j(Q) > 0$ и

$|u_i(\xi, \eta)| \leq u_j(Q)$ в $\bar{\Delta}$. Пусть $Q \in \Delta \cup C_0B_0$. Рассуждая аналогично доказательству леммы 7, из равенства (18) получим

$$\beta_j(Q)u_{j\eta}(Q) + \alpha_j(Q)u_j(Q) \leq \int_{PQ} \beta_j |h_j| |u_j| d\xi + \int_{PQ} \beta_j \sum_{k \neq j}^n |c_{jk}| |u_k| d\xi.$$

Из этой оценки в силу условия (17) следует, что

$$\beta_j(Q)u_{j\eta}(Q) \leq -u_j(Q) \left[\alpha_j(Q) - \int_{PQ} \beta_j \left(|h_j| + \sum_{k \neq j}^n |c_{jk}| d\xi \right) \right] < 0.$$

Последнее противоречит тому, что в точке $Q \in \Delta \cup C_0B_0$ максимума функции $u_j(\xi, \eta)$ производная $u_{j\eta}(Q)$ неотрицательна. Полученное противоречие доказывает утверждение.

ЗАМЕЧАНИЕ 4. (а) Если $h_i \geq 0$ и $c_{ik} \leq 0$ при $k \neq i$ в области Δ , то условие (17) равносильно (16).

В самом деле, пусть $h_i \geq 0$ и $c_{ik} \leq 0$ при $k \neq i$ в области Δ . Тогда $\beta_i h_i = \alpha_i \xi - \beta_i c_{ii}$ и

$$\alpha_i(\xi, \eta) - \int_0^\xi \beta_i \left(h_i - \sum_{k \neq i}^n c_{ik} \right) dt = \alpha_i(0, \eta) + \int_0^\xi \beta_i(t, \eta) \sum_{k=1}^n c_{ik}(t, \eta) dt > 0.$$

(б) Если $h_i \geq 0$ в области Δ , то условие (17) равносильно неравенству

$$\alpha_i(0, \eta) + \int_0^\xi \beta_i \left(c_{ii} - \sum_{k \neq i}^n |c_{ik}| \right) dt > 0.$$

(в) Если $h_i(\xi, \eta) \geq 0$, $c_{ik}(\xi, \eta) \leq 0$ при $k \neq i$, $c_{ii} + \sum_{k \neq i}^n c_{ik} \geq 0$ в области Δ и $\alpha_i(0, \eta) > 0$ на промежутке $(0, l]$, то условие (16) всегда выполнено.

Рассмотрим случай, когда коэффициенты системы (15) не удовлетворяют условиям (16) или (17).

Лемма 9. *Функции h_i и $h_i + \sum_{k \neq i}^n c_{ik}$ являются инвариантами системы (15) относительно преобразований вида*

$$u_i(\xi, \eta) = v_i(\xi, \eta) \exp \mu(\xi, \eta), \tag{19}$$

где μ — числовая функция из пространства C^2 .

Действительно, после подстановки (19) в систему (15) получим

$$v_i \xi_\eta + a'_i v_{i\xi} + b'_i v_{i\eta} + \sum_{k=1}^n c'_{ik} v_k = 0,$$

где $a'_i = a_i + \mu_\eta$, $b'_i = b_i + \mu_\xi$, $c'_{ik} = c_{ik}$ при $k \neq i$, $c'_{ii} = a_i \mu_\xi + b_i \mu_\eta + \mu_{\xi\eta} + \mu_\xi \mu_\eta + c_{ii}$.

Тогда легко видеть, что

$$h'_i = a'_i \xi + a'_i b'_i - c'_{ii} = a_i \xi + a_i b_i - c_{ii} = h_i, \quad h'_i + \sum_{k \neq i}^n c'_{ik} = h_i + \sum_{k \neq i}^n c_{ik}.$$

Из этой леммы вытекает, что преобразованиями вида (19) можно добиться выполнения условия (16) при определенной гладкости коэффициентов системы (15) в $\bar{\Delta}$.

§ 4. Экстремальные свойства решений системы в смешанной области

1. Принцип экстремума в классе регулярных решений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Регулярным в области D решением системы (1) назовем функцию $U(x, y)$, удовлетворяющую условиям (2) и (3), и такую, что $U_\eta \in C(\overline{\Delta} \setminus \overline{A_0 B_0})$.

Теорема 1. Пусть 1) коэффициенты системы (1) в области D_+ удовлетворяют условиям леммы 3;

2) коэффициенты системы (1) в области D_- в характеристических координатах (ξ, η) удовлетворяют условиям леммы 7;

3) $F_i(x, y) \geq 0$ ($F_i(x, y) \leq 0$) в $D_+ \cup D_-$;

4) $U(x, y)$ — регулярное в D решение системы (1), равное нулю на характеристике AC .

Тогда если $\max_i \max_{\overline{D}} u_i(x, y) > 0$ ($\min_i \min_{\overline{D}} u_i < 0$), то этот максимум (минимум) достигается на кривой $\overline{\Gamma}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\max_i \max_{\overline{D}} u_i(x, y) = u_j(Q) > 0$. В силу леммы 7 $Q \in \overline{D}_+$. На основании леммы 3 $Q \notin D_+$. Следовательно, $Q \in AB \cup \overline{\Gamma}$. Пусть $Q \in AB$, т. е. $Q = (x_0, 0)$, $0 < x_0 < l$. В этой точке из области D_- в силу леммы 7:

$$\lim_{y \rightarrow 0^-} u_{jy}(x_0, y) \geq 0,$$

что на основании леммы 5 противоречит неравенству (13).

Теорема 2. Пусть 1) коэффициенты системы (1) в области D_+ удовлетворяют условиям леммы 4;

2) коэффициенты системы (1) в области D_- в характеристических координатах (ξ, η) удовлетворяют условиям леммы 8;

3) $F_i(x, y) \equiv 0$ в $D_+ \cup D_-$;

4) $U(x, y)$ — регулярное в D решение системы (1), равное нулю на характеристике AC .

Тогда если $\max_i \max_{\overline{D}} |u_i(x, y)| > 0$, то этот максимум достигается на $\overline{\Gamma}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\max_i \max_{\overline{D}} |u_i(x, y)| = |u_j(Q)| > 0$. На основании леммы 8 точка Q находится на множестве \overline{D}_+ . В силу леммы 4 $Q \notin D_+$. Тогда $Q \in AB \cup \overline{\Gamma}$. Допустим, что точка $Q \in AB$, т. е. $Q = (x_0, 0)$, $0 < x_0 < l$. В этой точке из области D_- вследствие леммы 4 имеем

$$\lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{\partial}{\partial y} |u_j(x_0, y)| \geq 0,$$

что ввиду леммы 6 противоречит неравенству (14). Следовательно, $Q \in \overline{\Gamma}$.

Следствие 1. (а) Если выполнены условия теоремы 1 и $F_i(x, y) \equiv 0$ в $D_+ \cup D_-$, то для любой точки $(x, y) \in \overline{D}$ справедлива оценка

$$\min_i \min_{\overline{\Gamma}} u_i(x, y) \leq u_i(x, y) \leq \max_i \max_{\overline{\Gamma}} u_i(x, y). \quad (20)$$

(б) Если выполнены условия теоремы 2, то для любой точки $(x, y) \in \overline{D}$

$$|u_i(x, y)| \leq \max_i \max_{\overline{\Gamma}} |u_i(x, y)|. \quad (21)$$

(в) Если коэффициенты системы (1) удовлетворяют условиям теоремы 1 или теоремы 2 и в классе регулярных в D решений системы (1) существует решение задачи Трикоми, то оно единственно.

Следствие 2. (а) Пусть 1) коэффициенты системы (1) удовлетворяют условиям 1 и 2 теоремы 1;

2) $F_i(x, y) \leq 0 (\geq 0)$ в $D_+ \cup D_-$;

3) $U(x, y)$ — регулярное в D решение системы (1), равное нулю на характеристике AC .

Тогда если $u_i \geq 0 (\leq 0)$ на $\bar{\Gamma}$, то $u_i \geq 0 (\leq 0)$ в \bar{D} .

(б) Пусть 1) коэффициенты системы (1) удовлетворяют условиям теоремы 1;

2) $L_i U \leq L_i V$ в области $D_- \cup D_+$;

3) $u_i = v_i$ на AC ;

4) $u_i \geq v_i$ на Γ .

Тогда $u_i \geq v_i$ в области D .

2. Принцип экстремума в классе обобщенных решений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Функцию $U(x, y)$ назовем *обобщенным в области D решением системы (1)*, если существует последовательность регулярных в области D решений $\{U_p(x, y)\}$ системы (1), равномерно сходящаяся к $U(x, y)$ в замкнутой области \bar{D} .

Теорема 3. Пусть выполнены условия 1–3 теоремы 1 и $U(x, y)$ — обобщенное в D решение системы (1), равное нулю на характеристике AC . Тогда если $\max_i \max_{\bar{D}} u_i(x, y) > 0$ ($\min_i \min_{\bar{D}} u_i(x, y) < 0$), то этот максимум (минимум) достигается на кривой $\bar{\Gamma}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\max_i \max_{\bar{D}} u_i(x, y) = u_j(Q) = M > 0$, и допустим, что $Q \notin \bar{\Gamma}$. Тогда $Q \in \bar{D} \setminus \bar{\Gamma}$. Положим $E_i = \{(x, y) \in \bar{D} \setminus \bar{\Gamma} \mid u_i(x, y) = M\}$ и $E = \bigcup E_i$. Множество E замкнуто и не имеет общих точек с кривой $\bar{\Gamma}$. Поскольку множества $\bar{\Gamma}$ и E замкнуты, ограничены и не имеют общих точек, то расстояние между ними больше нуля. Поэтому существует простая кривая σ , лежащая в области D_+ , с концами в точках A и B такая, что $\bar{\sigma} \cap E = \emptyset$ и $E \subset D_\sigma$, где D_σ — область, ограниченная кривыми σ , AC и CB . Так как $U(x, y)$ — обобщенное решение системы (1), равное нулю на AC , существует последовательность регулярных в D решений $\{U_p(x, y)\} = \{(u_1^p, u_2^p, \dots, u_n^p)\}$ системы (1) таких, что $U_p(x, y) = 0$ на \overline{AC} и $\{U_p(x, y)\}$ в \bar{D} равномерно сходится к $U(x, y)$. Поскольку в области D_σ выполнены условия теоремы 1, то $\max_i \max_{\bar{D}_\sigma} u_i^p(x, y)$ достигается на кривой $\bar{\sigma}$ при любом $p \in \mathbb{N}$.

Пусть $\max_i \max_{\bar{\sigma}} u_i(x, y) = M_0$. Ясно, что $M_0 < M$. Обозначим $\varepsilon = (M - M_0)/2$. В силу равномерной сходимости последовательности $\{U_p(x, y)\}$ в \bar{D}_σ для взятого $\varepsilon > 0$ существует номер p_0 такой, что для всех $p > p_0$, $1 \leq i \leq n$ и $(x, y) \in \bar{D}_\sigma$ выполняется условие

$$u_i(x, y) - \varepsilon < u_i^p(x, y) < u_i(x, y) + \varepsilon.$$

Отсюда $\max_i \max_{\bar{D}_\sigma} u_i^p(x, y) \geq u_j^p(Q) > u_j(Q) - \varepsilon = (M + M_0)/2$ при $p > p_0$. На кривой $\bar{\sigma}$ имеем $u_i^p(x, y) < u_i(x, y) + \varepsilon \leq (M + M_0)/2$ при $p > p_0$, $i = \bar{1}, n$.

Следовательно, $\max_i \max_{\overline{D}_\sigma} u_i^p(x, y)$ при $p > p_0$ не достигается на кривой $\overline{\sigma}$, что противоречит теореме 1. Полученное противоречие и доказывает наше утверждение. Принцип минимума доказывается аналогично.

Теорема 4. Пусть выполнены условия 1–3 теоремы 2 и $U(x, y)$ — обобщенное в D решение системы (1), равное нулю на AC . Тогда если $\max_i \max_{\overline{D}} |u_i(x, y)| > 0$, то этот максимум достигается на кривой $\overline{\Gamma}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО проводится аналогично доказательству теоремы 3 с применением теоремы 2.

Следствие 3. (а) Если выполнены условия теоремы 3, при этом $F_i(x, y) \equiv 0$, то для любой точки $(x, y) \in \overline{D}$ справедлива оценка (20).

(б) Если выполнены условия теоремы 4, то для любой точки $(x, y) \in \overline{D}$ справедлива оценка (21).

(в) Если коэффициенты системы (1) удовлетворяют условиям теоремы 3 или теоремы 4 и в классе обобщенных в D решений системы (1) существует решение задачи Трикоми, то оно единственно.

Следствие 4. (а) Пусть 1) коэффициенты системы (1) удовлетворяют условиям 1 и 2 теоремы 1;

2) $F_i(x, y) \leq 0$ (≥ 0) в $D_+ \cup D_-$;

3) $U(x, y)$ — обобщенное в D решение системы (1), равное нулю на характеристике AC . Тогда если $u_i \geq 0$ (≤ 0) на $\overline{\Gamma}$, то $u_i \geq 0$ (≤ 0) в \overline{D} .

(б) Пусть 1) коэффициенты системы (1) удовлетворяют условиям теоремы 3;

2) $L_i U \leq L_i V$ в области $D_- \cup D_+$;

3) $u_i = v_i$ на AC ;

4) $u_i \geq v_i$ на Γ .

Тогда $u_i \geq v_i$ в области D .

§ 5. Примеры

Приведем примеры для иллюстрации изложенной теории.

1. В области D рассмотрим задачу Трикоми для уравнения смешанного типа:

$$\operatorname{sgn} y \cdot w_{xx} + w_{yy} + Mw_x - \lambda w = 0, \quad (22)$$

где M — вещественная постоянная, а λ — комплексный параметр. Пусть $\operatorname{Re} w = u_1$, $\operatorname{Im} w = u_2$, $\operatorname{Re} \lambda = \alpha$, $\operatorname{Im} \lambda = \beta$. Тогда задача Трикоми для уравнения (22) равносильна задаче T для системы

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn} y u_{1xx} + u_{1yy} + Mu_{1x} - \alpha u_1 + \beta u_2 &= 0, \\ \operatorname{sgn} y u_{2xx} + u_{2yy} + Mu_{2x} - \beta u_1 - \alpha u_2 &= 0. \end{aligned} \quad (23)$$

Лемма 10. Если $\alpha \geq |\beta|$, $M \leq -\sqrt{2(\alpha + |\beta|)}$, $U(x, y) = (u_1, u_2)$ — функция, удовлетворяющая условиям (2), (3) применительно к системе (23) и равная нулю на характеристике AC , то для системы (23) справедливы теорема 2 и следствие 1.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для системы (23) $K(y) = \operatorname{sgn} y$, $A_1(x, y) = A_2(x, y) = M$, $B_1(x, y) = B_2(x, y) \equiv 0$, $C_{11}(x, y) = C_{22}(x, y) = -\alpha$, $C_{12}(x, y) = \beta = -C_{21}(x, y)$. Отсюда видно, что если $\alpha \geq |\beta|$, то коэффициенты системы (23) удовлетворяют условию 1 теоремы 2.

Система (23) в характеристических координатах $\xi = x + y, \eta = x - y$ имеет вид

$$u_{1\xi\eta} - \frac{M}{4}(u_{1\xi} + u_{1\eta}) + \frac{\alpha}{4}u_1 - \frac{\beta}{4}u_2 = 0, \quad u_{2\xi\eta} - \frac{M}{4}(u_{2\xi} + u_{2\eta}) + \frac{\beta}{4}u_1 + \frac{\alpha}{4}u_2 = 0. \quad (24)$$

Отсюда $a_1 = a_2 = -\frac{M}{4}, b_1 = b_2 = -\frac{M}{4}, c_{11} = c_{22} = \frac{\alpha}{4}, c_{12} = -\frac{\beta}{4}, c_{21} = \frac{\beta}{4}, h_1 = h_2 = \frac{M^2}{16} - \frac{\alpha}{4}, \beta_1 = \beta_2 = \exp(-\frac{M}{4}\xi), \alpha_1 = \alpha_2 = -\frac{M}{4}\exp(-\frac{M}{4}\xi)$. Тогда условие (17) для системы (24) принимает вид

$$-\frac{M}{4}\exp\left(-\frac{M}{4}\xi\right) - \int_0^\xi \exp\left(-\frac{M}{4}t\right) \left(\left|\frac{M^2}{16} - \frac{\alpha}{4}\right| + \left|\frac{\beta}{4}\right|\right) dt > 0,$$

где необходимо $M < 0, 0 < \xi \leq l$, или

$$M^2 - (|M^2 - 4\alpha| + 4|\beta|) \frac{\exp(-M\xi/4) - 1}{\exp(-M\xi/4)} > 0. \quad (25)$$

Для выполнения неравенства (25) достаточно, чтобы

$$M^2 - 4|\beta| - |M^2 - 4\alpha| \geq 0,$$

а последнее равносильно неравенству $M \leq -\sqrt{2(\alpha + |\beta|)}$.

Таким образом, при указанных выше ограничениях коэффициенты системы (23) удовлетворяют условиям теоремы 2. Отсюда следует требуемое.

2. Рассмотрим задачу Трикоми для более общей, чем (1), нелинейной системы

$$L_i U \equiv K(y)u_{ixx} + u_{iy y} + A_i u_{ix} + B_i u_{iy} + F_i(x, y, U) = 0, \quad (26)$$

где $K(y), A_i(x, y), B_i(x, y), F_i(x, y, U)$ — заданные в области D числовые функции, причем $|u_i| \leq K_0$ в областях D_+ и D_- , и существуют непрерывные частные производные $\partial F_i / \partial u_k, i, k = \overline{1, n}, n \geq 2$.

Пусть $Z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ и $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ — любые функции из класса регулярных в D решений системы (26). Тогда их разность $U = W - Z$ является регулярным в D решением линейной системы. Действительно,

$$L_i(W) - L_i(Z) = K(y)u_{ixx} + u_{iy y} + Au_{ix} + Bu_{iy} + F_i(x, y, W) - F_i(x, y, Z) = 0. \quad (27)$$

Пусть $G(t) = F_i[x, y, tw_1 + (1-t)z_1, tw_2 + (1-t)z_2, \dots, tw_n + (1-t)z_n]$. Тогда

$$F_i(x, y, W) - F_i(x, y, Z) = \int_0^1 G'(t) dt = \sum_{k=1}^n u_k \int_0^1 \frac{\partial F_i}{\partial u_k} dt. \quad (28)$$

С учетом равенства (28) система (27) принимает вид

$$K(y)u_{ixx} + u_{iy y} + Au_{ix} + Bu_{iy} + \sum_{k=1}^n C_{ik} u_k = 0, \quad (29)$$

где

$$C_{ik} = \int_0^1 \frac{\partial F_i}{\partial u_k} dt.$$

Отсюда ясно, что если коэффициенты системы (29) удовлетворяют условиям теорем 1 или 2 и $U = W - Z = 0$ на характеристике AC , то $\max_i \max_{\overline{D}} (w_i - z_i)$ или $\max_i \max_{\overline{D}} |w_i - z_i|$ достигается на $\overline{\Gamma}$.

Таким образом, если в классе регулярных в D решений системы (26) существует решение задачи Т, то оно единственно при выполнении соответствующих условий относительно коэффициентов этой системы.

ЗАМЕЧАНИЕ 5. В работе [5] для системы (26) $A = B \equiv 0$ при $K(y) = y$, $\partial F_i / \partial u_k > 0$ при $k, i = \overline{1, n}$ в \overline{D} и $|u_i| \leq k_0$; в D_+ матрица $(\partial F_i / \partial u_k)$ отрицательно определенная и

$$(n-1) \left(\frac{\partial F_i}{\partial u_k} + \frac{\partial F_k}{\partial u_i} \right) \leq 2 \left(\frac{\partial F_i}{\partial u_i} \frac{\partial F_k}{\partial u_k} \right)^{1/2}, \quad i \neq k;$$

в области D_- функции $\partial F_i / \partial u_k$ достаточно малы, в классе ее регулярных решений доказана единственность решения задачи Т. На основе теоремы единственности методом интегральных уравнений получена теорема существования регулярного решения задачи Т.

Если кривая Γ из класса Ляпунова в точках A и B оканчивается сколь угодно малыми дугами «нормальной» кривой, $\Phi \in C^1(\overline{\Gamma})$, $\Psi \in C^3[0, l/2]$, $\Psi(0) = \Phi(0, 0) = \Phi(l, 0) = 0$, то аналогично [5] для системы (26) методом интегральных уравнений проводится доказательство существования регулярного решения задачи Т.

Отметим также, что задача Т для нелинейных уравнений смешанного типа изучалась в работах [20, 21].

§ 6. Об условной разрешимости задачи Трикоми

В дальнейшем предположим, что $K(y) = \operatorname{sgn} y |y|^m$, $m = \operatorname{const} \geq 0$, $F_i(x, y) \equiv 0$, $A_i(x, y), B_i(x, y) \in C^1(\overline{D}_+) \wedge C^2(\overline{D}_-)$, $C_{ik}(x, y) \in C(\overline{D}_+ \cup \overline{D}_-)$ удовлетворяют условиям теоремы 1 или 2; Γ — кривая из класса Ляпунова, $x = x(s)$, $y = y(s)$ — параметрические уравнения кривой Γ , s — длина дуги кривой Γ , отсчитываемая от точки B , S — длина кривой Γ ; Γ_0 — «нормальная» кривая системы (1), заданная уравнением $(x - l/2)^2 + 4y^{m+2}/(m+2)^2 = (l/2)^2$; D_0 — область, ограниченная кривыми Γ_0 , AC и CB ; $\Phi(x, y) = \Phi(x(s), y(s)) = \Phi(s)$, $0 \leq s \leq S$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Регулярное в D решение системы (1), удовлетворяющее условиям (4), (5), назовем *регулярным решением задачи Т* для системы (1).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. Равномерный в \overline{D} предел последовательности регулярных решений задачи Т назовем *обобщенным решением задачи Т*.

Теорема 5. Пусть в области D при условии, когда кривая Γ оканчивается в точках A и B сколь угодно малыми дугами «нормальной» кривой, существует регулярное решение задачи Т для системы (1). Тогда если $\Phi(s) \in C[0, S]$ и $\Psi(x) \in C^3[0, l/2]$, $\psi_i(0) = \phi_i(0) = \phi_i(S) = 0$, то существует единственное обобщенное решение $U(x, y)$ задачи Т с граничными данными $U = \Phi$ на Γ и $U = \Psi$ на AC при произвольном подходе кривой Γ к оси $y = 0$, за исключением случая, когда в достаточно малых окрестностях концов кривой Γ производная dx/ds меняет знак.

Предварительно установим следующие вспомогательные утверждения.

Лемма 11. Если $U(x, y) \in C(\overline{D}_+) \wedge C^2(D_+)$, $L_i U \equiv 0$ в области D_+ при всех $i = \overline{1, n}$, $u_i = 0$ на кривой Γ , то для $(x, y) \in D_+ \cup \Gamma$ справедлива оценка

$$|u_i(x, y)| \leq \theta \max_i \max_{0 \leq x \leq l} |u_i(x, 0)|, \quad 0 < \theta < 1.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЭТОЙ ЛЕММЫ СЛЕДУЕТ ИЗ ЛЕММЫ 3.

Лемма 12. Если $D_{0+} \cup \Gamma_0 \subset D_+$, $\Phi_0(x) \in C[0, l]$, $\Psi(x) \in C^3[0, l/2]$, $\Phi_0(0) = \Psi(0)$, то существует обобщенное решение $U(x, y)$ задачи Т с граничными данными $U = \Phi_0$ на Γ_0 и $U = \Psi$ на AC .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\{\Phi_{0p}(x)\} = \{(\varphi_{01}^p, \varphi_{02}^p, \dots, \varphi_{0n}^p)\}$ — последовательность гладких вектор-функций таких, что $\varphi_{0i}(x) = \lim_p \varphi_{0i}^p(x)$ равномерно на сегменте $[0, l]$ и $\Phi_{0p}(0) = \Phi_0(0)$.

По условию теоремы 5 существует регулярное в D_0 решение $U_p(x, y)$ задачи Т с краевыми данными $U_p = \Phi_{0p}$ на Γ_0 и $U_p = \Psi$ на AC .

На основании следствия 1 из теоремы 1 в \overline{D}_0 получаем оценку

$$|u_i^p(x, y) - u_i^q(x, y)| \leq \max_i \max_{\overline{\Gamma}_0} |\varphi_{0i}^p - \varphi_{0i}^q|.$$

Отсюда вытекает, что в \overline{D}_0 последовательность $\{U_p(x, y)\} = \{(u_1^p, u_2^p, \dots, u_n^p)\}$ регулярных решений задачи Т равномерно сходится. Пусть $\lim_p U_p(x, y) = U(x, y)$.

Предельная функция $U(x, y)$ непрерывна в \overline{D}_0 , $U = \Phi_0$ на Γ_0 и $U = \Psi$ на AC .

При $\Psi = 0$ для этой функции справедлива оценка

$$|u_i(x, y)| \leq \max_i \max_{\overline{\Gamma}_0} |\varphi_{0i}(x)|. \tag{30}$$

Лемма 13. Пусть $D_{0+} \cup \Gamma_0 \subset D_+$. Если $\Phi(s) \in C[0, S]$ и $\Psi(x) \in C^3[0, l/2]$, то существует обобщенное решение задачи Т с граничными данными $U = \Phi$ на Γ и $U = \Psi$ на AC .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для построения такого решения применим альтернирующий метод типа Шварца.

В областях D_+ и D_0 построим две последовательности решений системы (1). В силу леммы 12 в области D_0 существует обобщенное решение $Z_0 = (z_1^0, z_2^0, \dots, z_n^0)$ задачи Т с данными $z_i^0 = 0$ на кривой Γ_0 и $Z_0 = \Psi$ на AC .

В области D_+ существует решение задачи Дирихле для системы (1) с данными $U_0 = \Phi$ на $\overline{\Gamma}$ и $U_0 = Z_0$ на отрезке \overline{AB} [22, гл. II, § 3].

Пусть $Z_p(x, y)$ — обобщенное решение задачи Т в области D_0 для системы (1) с граничными данными $Z_p(x, y) = U_{p-1}(x, y)$ на $\overline{\Gamma}_0$ и $Z_p = \Psi$ на AC , где $p = 1, 2, \dots$, $U_p(x, y)$ — решение задачи Дирихле для системы (1) в области D_+ с данными $U_p = \Phi$ на $\overline{\Gamma}$ и $U_p = Z_p$ на \overline{AB} .

Докажем, что последовательности $\{U_p(x, y)\}$ и $\{Z_p(x, y)\}$ равномерно сходятся в \overline{D}_+ и \overline{D}_0 .

Действительно, в силу леммы 3

$$|u_i^{p+1} - u_i^p| \leq \max_i \max_{0 \leq x \leq l} |z_i^{p+1}(x, 0) - z_i^p(x, 0)| \leq \max_i \max_{\overline{D}_0} |z_i^{p+1}(x, y) - z_i^p(x, y)|. \tag{31}$$

С другой стороны, ввиду оценки (30) и леммы 11

$$\begin{aligned} |z_i^{p+1}(x, y) - z_i^p(x, y)| &\leq \max_i \max_{\overline{\Gamma}_0} |u_i^p - u_i^{p-1}| \\ &\leq \theta \max_i \max_{0 \leq x \leq l} |u_i^p(x, 0) - u_i^{p-1}(x, 0)| \leq \theta \max_i \max_{\overline{D}_0} |z_i^p - z_i^{p-1}|. \end{aligned}$$

Продолжая это рассуждение шаг за шагом, получим

$$|z_i^{p+1} - z_i^p| \leq \theta^p \max_i \max_{\overline{D}_0} |z_i^1 - z_i^0|. \tag{32}$$

Из оценок (31) и (32) вытекает, что

$$|u_i^{p+1} - u_i^p| \leq \theta^p \max_i \max_{\overline{D}_0} |z_i^1 - z_i^0|. \tag{33}$$




Рис.1.

Тогда в силу оценок (32) и (33) следует, что

$$\lim_p U_p(x, y) = U(x, y) = (u_1, u_2, \dots, u_n)$$

равномерно в \overline{D}_0 и

$$\lim_p Z_p(x, y) = Z(x, y) = (z_1, z_2, \dots, z_n)$$

равномерно в \overline{D}_+ .

Очевидно, что в \overline{D}_{0+} имеем $Z(x, y) \equiv U(x, y)$. Следовательно, функция $U(x, y)$ является «аналитическим» продолжением функции $Z(x, y)$ и регулярным решением системы (1) в области D_+ . Кроме того, при $\Psi = 0$

$$|u_i(x, y)| \leq \max_i \max_{\Gamma} |\varphi_i|. \quad (34)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6. Функцию $U(x, y) = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ назовем *неотрицательной (положительной)* на множестве $E \subset \mathbb{R}^2$, если $u_i(x, y) \geq 0$ ($u_i > 0$) на E при всех $i = \overline{1, n}$.

Лемма 14. Пусть выполнены все условия леммы 13 и $\Phi(s) > 0$ на $(0, S)$, тогда существует обобщенное решение $U(x, y)$ задачи Γ для системы (1) такое, что $U(x, y) = 0$ на AC , $U(x, y) \geq 0$ в \overline{D} и $U(x, y) > 0$ в $D_+ \cup \Gamma$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По лемме 13 существует обобщенное в D решение $U(x, y)$ задачи Γ для системы (1) с граничными условиями $U = \Phi$ на $\overline{\Gamma}$ и $U = 0$ на AC . В области D_+ такое решение задачи Γ является решением системы (1). Если $\varphi_i(s) > 0$ на Γ , то с учетом следствия 2 $u_i(x, y) \geq 0$ в \overline{D} . Допустим, что $\min_i \min_{\overline{D}_+} u_i(x, y) = u_j(Q) = 0$ и $Q \in D_+$. Так как $U(x, y)$ в области D_+ является регулярным решением системы (1), в силу леммы 3 $u_i(x, y) \equiv \text{const} = 0$ в \overline{D}_+ . Последнее противоречит тому, что $u_i > 0$ на кривой Γ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 5. Пусть кривая Γ подходит к оси $y = 0$, как, например, указано на рис. 1.

1. Пусть $U = \Psi = 0$ на AC и $\Phi(s) = 0$ при $y < h$ и $\Phi(s) \geq 0$ при $y \geq h$, $h = \text{const} > 0$. Построим последовательность дуг Γ_p , $p = 1, 2, \dots$, удовлетворяющих условиям:

- 1) Γ и Γ_p совпадают при $y \geq h$;
- 2) Γ_p оканчивается в точках A и B малыми дугами c_p и c'_p «нормальных» кривых;
- 3) Γ_p — гладкая кривая из класса Ляпунова;
- 4) дуги c_p и c'_p стягиваются в точки A и B соответственно при $p \rightarrow \infty$.

Пусть D_p — область, ограниченная дугой Γ_p и характеристиками AC и CB . На кривой Γ_p определим функцию $\Phi_p(s)$ следующим образом:

$$\Phi_p(s) = \begin{cases} \Phi(s), & y \geq h, \\ 0, & y < h. \end{cases}$$

По условию в области D_p существует регулярное решение $U_p(x, y)$ задачи T с граничными условиями $U_p = \Phi_p$ на Γ_p и $U_p = \Psi = 0$ на AC .

Пусть $Z(x, y) = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ — обобщенное решение задачи T в области D^* , равное нулю на AC , и $Z(x, y) > 0$ в D_+^* , где $D_-^* \equiv D_-$, $D_+^* \supset D_+ \cup \Gamma$. Такое решение в силу леммы 14 существует. Так как $z_i(x, y) > 0$ в D_+^* , то можно найти постоянную M , не зависящую от p и i и такую, что на кривой Γ_p имеет место неравенство $Mz_i - u_i^p \geq 0$. Отсюда на основании следствия 4

$$Mz_i - u_i^p \geq 0 \quad \text{в } \overline{D}_p. \tag{35}$$

Пусть $G_p = D_p \cap D$. Положим

$$v_i^p(x, y) = \begin{cases} u_i^p(x, y), & (x, y) \in \overline{D}_p, \\ 0, & (x, y) \in \overline{D} \setminus \overline{D}_p. \end{cases}$$

Оценим $|v_i^q - v_i^p|$, где $q > p$, в D . Пусть K_p и K'_p — два круга с центрами в точках A и B , внутри которых содержатся соответственно дуги c_p и c'_p , причем радиусы этих кругов стремятся к нулю при $p \rightarrow \infty$. Положим $\varepsilon_p = \max_i \max_{\overline{K}_p \cup \overline{K}'_p} z_i(x, y)$. Тогда из оценки (35) вытекает, что на границе G_p при $y \geq 0$

$$|v_i^q - v_i^p| = |u_i^q - u_i^p| \leq 2Mz_i \leq 2M\varepsilon_p.$$

Поэтому всюду в \overline{G}_p справедлива оценка $|v_i^q - v_i^p| \leq 2M\varepsilon_p$.

Для точек $(x, y) \in \overline{D} \cup \overline{D}_q \setminus \overline{D}_p$ имеем $0 \leq v_i^p \leq M\varepsilon_p$, а для $(x, y) \in \overline{D} \setminus \overline{D}_q$ будет $v_i^p(x, y) = v_i^q(x, y) = 0$. Тогда для $(x, y) \in \overline{D}$ получаем $|v_i^q - v_i^p| \leq 2M\varepsilon_p$. Поскольку $\varepsilon_p \rightarrow 0$ при $p \rightarrow \infty$, из последней оценки следует, что последовательность $\{V_p(x, y)\} = \{(v_1^p, v_2^p, \dots, v_n^p)\}$ равномерно сходится в \overline{D} . Тогда

$$\lim_p V_p(x, y) = \lim_p U_p(x, y) = U(x, y).$$

Ясно, что $U(x, y)$ принимает на Γ значения $\Phi(s)$, а на характеристике AC будет $U = 0$. Функция $U(x, y)$ в области D_+ удовлетворяет системе (1) и непрерывна в \overline{D} . При этом справедлива оценка

$$0 \leq u_i(x, y) \leq \max_i \max_{\overline{\Gamma}} \varphi_i. \tag{36}$$

2. Пусть $\Phi(s)$ непрерывна и неотрицательна на $[0, S]$ и $\Phi(0) = \Phi(S) = 0$. Построим последовательность $\{\Phi_p(s)\}$ непрерывных неотрицательных функций, исчезающих в достаточно малых окрестностях точек $s = 0$ и $s = S$, таких, что $\varphi_i^1(s) \leq \varphi_i^2(s) \leq \dots, \lim_p \varphi_i^p(s) = \varphi_i(s)$ равномерно на $[0, S]$. По функциям $\Phi_p(s)$

в силу п. 1 построим последовательность $\{U_p(x, y)\}$ решений задачи Т. Тогда из оценки (36) при $q > p$ в \overline{D} вытекает, что

$$0 \leq u_i^q - u_i^p \leq \max_i \max_{\overline{\Gamma}} (\varphi_i^q - \varphi_i^p).$$

Отсюда следует, что в \overline{D} существует равномерный предел

$$\lim_p U_p(x, y) = U(x, y).$$

В области D_+ функция U удовлетворяет системе (1), $U = \Phi$ на Γ , $U = 0$ на AC и $U(x, y)$ непрерывна в \overline{D} . Кроме того, имеет место оценка

$$0 \leq u_i(x, y) \leq \max_i \max_{\overline{\Gamma}} \varphi_i. \quad (37)$$

3. Пусть $\Phi(s)$ — произвольная непрерывная функция и $\Phi(0) = \Phi(S) = 0$. В этом случае функцию $\Phi(s)$ можно представить в виде разности двух неотрицательных функций:

$$\begin{aligned} \Phi(s) &= \Phi_+(s) - \Phi_-(s) = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n), \\ \Phi_{\pm}(s) &= (\varphi_1^{\pm}, \varphi_2^{\pm}, \dots, \varphi_n^{\pm}), \quad \varphi_i(s) = \varphi_i^+ - \varphi_i^-, \\ \varphi_i^+(s) &= \max(0, \varphi_i(s)), \quad \varphi_i^-(s) = \max(0, -\varphi_i(s)), \\ |\varphi_i| &= \varphi_i^+ + \varphi_i^-, \quad \Phi_+(0) = \Phi_-(0) = \Phi_+(S) = \Phi_-(S) = 0. \end{aligned}$$

В силу п. 2 решение задачи Т для системы (1) определяется формулой $U(x, y) = U_+(x, y) - U_-(x, y) = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, где $u_i(x, y) = u_i^+(x, y) - u_i^-(x, y)$, $U_+(x, y)$ и $U_-(x, y)$ строятся соответственно по функциям $\Phi_+(s)$ и $\Phi_-(s)$.

На основании оценки (37) получим

$$\begin{aligned} |u_i(x, y)| &\leq u_i^+(x, y) + u_i^-(x, y) \leq \max_i \max_{\overline{\Gamma}} \varphi_i^+(s) + \max_i \max_{\overline{\Gamma}} \varphi_i^-(s) \\ &\leq \max_i \max_{\overline{\Gamma}} (\varphi_i^+ + \varphi_i^-) = \max_i \max_{\overline{\Gamma}} |\varphi_i|. \quad (38) \end{aligned}$$

4. Пусть $\Psi(x) \neq 0$, D^* — область из п. 1 с границей $\partial D^* = \Gamma^* \cup AC \cup CB$, причем $D_0 \cup \Gamma_0 \subset D^*$. По лемме 13 существует обобщенное решение $U_*(x, y)$ задачи Т, непрерывное в \overline{D}^* , с граничными данными $U_* = 0$ на Γ^* и $U_* = \Psi$ на AC .

Пусть $\Phi_*(s) = U_*$ на Γ . Тогда решение искомой задачи Т для области D определяется по формуле $U(x, y) = U_*(x, y) - \tilde{U}(x, y)$, где $\tilde{U}(x, y)$ — решение задачи Т в области D с граничными условиями $\tilde{U}(x, y) = \Phi(s) - \Phi_*(s)$ на Γ , $\tilde{U} = 0$ на AC .

Решение $\tilde{U}(x, y)$ задачи Т существует, что было показано в пп. 1–3.

Единственность построенного решения $U(x, y)$ задачи Т следует из оценок (34) и (38) или следствия 3.

Ранее альтернирующий метод Шварца был применен для доказательства теорем существования решения задачи Трикоми для уравнений Лаврентьева — Бицадзе [22, с. 323], Трикоми [23, гл. III; 24] и более общего уравнения смешанного типа [19].

ЛИТЕРАТУРА

1. Киквидзе З. А. Об одной системе уравнений в частных производных смешанного типа // Сообщ. АН Груз. ССР. 1954. Т. 15, № 6. С. 321–325.
2. Карамышев Ф. И. Краевая задача для системы дифференциальных уравнений в частных производных смешанного типа // Сиб. мат. журн. 1961. Т. 2, № 4. С. 537–546.

3. Диденко В. П. О некоторых системах дифференциальных уравнений смешанного типа // Докл. АН СССР. 1962. Т. 144, № 4. С. 709–712.
4. Диденко В. П. О некоторых системах дифференциальных уравнений смешанного и смешанно-составного типов // Дифференц. уравнения. 1966. Т. 2, № 1. С. 33–39.
5. Майоров И. В. Об одной нелинейной системе уравнений смешанного типа // Докл. АН СССР. 1968. Т. 183, № 2. С. 280–283.
6. Диденко В. П. Об обобщенной разрешимости граничных задач для систем дифференциальных уравнений смешанного типа // Дифференц. уравнения. 1972. Т. 8, № 1. С. 24–29.
7. Чекмарев Т. Е. Задачи с граничными условиями для некоторых систем уравнений различных типов. Автореф. дис. . . . докт. физ.-мат. наук. Казань: Казанский гос. университет, 1974.
8. Цымбал Т. Е. Краевые задачи для системы уравнений смешанного типа с негладкой линией вырождения. Автореф. дис. . . . канд. физ.-мат. наук. Киев, 1984.
9. Рябов А. В. Задача Т для одной системы дифференциальных уравнений в частных производных смешанного типа // Уравнения неклассического типа. Новосибирск: ИМ СО АН СССР, 1986. С. 138–142.
10. Чекмарев Т. Е. Задача Трикоми для модельной системы уравнений в областях специальных видов // Дифференц. уравнения. 1990. Т. 26, № 5. С. 860–871.
11. Сабитов К. Б. Принцип максимума для систем уравнений смешанного типа второго порядка // Докл. АН СССР. 1989. Т. 305, № 4. С. 783–786.
12. Hopf E. A. A remark on linear elliptic differential equations of second order // Proc. Amer. Math. Soc. 1952. V. 3. P. 791–793.
13. Лаврентьев М. М. О принципе максимума для решений сильно эллиптических систем второго порядка // Докл. АН СССР. 1957. Т. 116, № 2. С. 175–176.
14. Эйдельман С. Д. Интегральный принцип максимума для сильно параболических систем и некоторые его применения // Изв. вузов. Математика. 1959. № 2. С. 252–258.
15. Protter M. H., Weinberger H. F. Maximum principles in differential equations. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1967.
16. Hile G. N., Protter M. H. Maximum principles for a class of first order elliptical systems // J. Differential Equations. 1977. V. 24. P. 136–151.
17. Мазья В. Г., Кресин Г. И. О принципе максимума для сильно эллиптических систем второго порядка с постоянными коэффициентами // Мат. сб. 1984. Т. 125, № 4. С. 458–480.
18. Figueiredo D. G., Mitidieri E. A. A maximum principle for an elliptic system and applications to semilinear problems // SIAM J. Math. Anal. 1986. V. 17, N 4. P. 836–849.
19. Сабитов К. Б. К вопросу о существовании решения задачи Трикоми // Дифференц. уравнения. 1992. Т. 28, № 12. С. 2092–2101.
20. Ларькин Н. А. Об одном классе нелинейных уравнений смешанного типа // Сиб. мат. журн. 1978. Т. 19, № 6. С. 1308–1314.
21. Гвазава Д. К. О некоторых классах квазилинейных уравнений смешанного типа // Тр. Мат. ин-та АН Груз. ССР. 1981. Т. 67. С. 5–93.
22. Бицадзе А. В. Некоторые классы уравнений в частных производных. М.: Наука, 1981.
23. Бабенко К. И. К теории уравнений смешанного типа. Дис. . . . докт. физ.-мат. наук. М.: Мат. ин-т АН СССР, 1952.
24. Germain P., Bader R. Sur le problem de Tricomi // C. R. Acad. Sci. Paris. 1951. V. 232. P. 463–465.

Статья поступила 20 июня 2001 г.

*Сабитов Камиль Басирович, Мугафаров Марат Фавильевич
Стерлитамакский гос. педагогический институт СФ АН РБ,
пр. Ленина, 37, Стерлитамак 453103, РБ,
Стерлитамакский филиал АН Республики Башкортостан
sspi@soros.bashedu.ru, mmf@mail.rb.ru*